



Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Do Conhecimento Materno Dermatopediátrico No Puerpério Imediato.

Autores: ELISA MARIA MICHELS KRUGER (UNIVERSIDADE POSITIVO); FERNANDA SINKOS (UNIVERSIDADE POSITIVO); JÚLIA FELDMANN UHRY (UNIVERSIDADE POSITIVO); JÚLIO CESAR BEZERRA DE BONI (UNIVERSIDADE POSITIVO); CRISTINA TERUMI OKAMOTO (UNIVERSIDADE POSITIVO); KÁTIA SHEYLLA MALTA PURIN (UNIVERSIDADE POSITIVO); TAMARA FLORENCE BOSCH (UNIVERSIDADE POSITIVO); RENATO MITSUNORI NISHIHARA (UNIVERSIDADE POSITIVO)

Resumo: Objetivos: avaliar o conhecimento materno sobre a pele neonatal. Métodos: estudo transversal aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Amostra: 350 mulheres no puerpério imediato. Dados coletados por questionários socioepidemiológico e dermatopediátrico, totalizando 41 perguntas (cuidados diários, produtos e condutas perante dermatoses). Classificou-se o conhecimento materno em: excelente (acima 80), bom (60-79), regular (30-59), insuficiente (0-29). Critérios de inclusão: puérperas em alojamento conjunto, concordância com TCLE; de exclusão: menores de 18 anos. Resultados: média de idade materna 24,9. 348 (99,4) puérperas realizaram pré-natal. 76 (21,7) informaram-se sobre cuidados cutâneos com profissionais de saúde. 292 (83,4) procurariam orientação médica frente a dermatose, 21 (6) aguardariam evolução espontânea e 17 (4,8) aplicariam formulações tópicas. Produtos indispensáveis para cuidado diário: 226 (64,8) sabão; 109 (31,1) lenço umedecido. 207 (59,1) não consultariam pH do produto, 144 (41,1) optariam pelo neutro/básico. Pelo rótulo da embalagem, 222 (63,4) escolheriam os “dermatologicamente testados e infantis”, 74 (21,1) “hipoalergênicos e suaves”. Saponáceos eleitos: neutro (35,1), glicerina (21,4), antibacteriano (12,6). A maioria optaria por tempo (5 minutos) e temperatura (35°C) do banho adequados, respectivamente 53,1 e 51,1. 186 (53,2) evitariam exposição solar ou usariam barreira física; 80 (22,8) usariam fotoproteção antes de 6 meses. 83 (23,7) trocariam as fraldas após mamada, 125 (35,7) quando úmida e 36 (10,3) se fezes presentes. 215 (61,4) tratariam dermatite de fraldas com pomada (44 comum e 4,5 antifúngica); 27 (7) trocariam a marca da fralda. 334 (95,4) higienizariam o coto umbilical com álcool 70 após o banho ou troca de fraldas. 194 (55,4) acertaram menos de 60 do questionário. Conclusão: predominou conhecimento baixo. Prevaleceu procurar orientações mediante dermatoses, sendo a pele um dos focos pediátricos. Principais erros: priorizar lenço umedecido, sabonete em barra, antibacteriano, produtos aromáticos e ignorar pH. Os acertos: fotoproteção, temperatura do banho e limpeza do coto.