

2º DERMAPED
SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE DERMATOLOGIA PEDIÁTRICA

11 a 13 de Abril de 2018
Curitiba - Paraná

Trabalhos Científicos

Título: Avaliação Epidemiológica De Crianças Com Molusco Contagioso

Autores: MARIANA TOSATO ZINHER (UFPR); JULIANA GOMES LOYOLA PRESA (UFPR)

Resumo: Objetivo: Avaliar características epidemiológicas e do tratamento de pacientes com molusco contagioso, comparando os resultados com a literatura. Método: Estudo retrospectivo, analítico e observacional, baseado na revisão de prontuários de pacientes com idade entre zero e 14 anos atendidos no serviço de dermatologia pediátrica do HC-UFPR entre 2012 e 2015. Foram avaliadas características populacionais, das lesões e do tratamento. Resultados: Foram analisados dados de 80 pacientes, observando-se predomínio no sexo feminino (60). A mediana de idade na primeira consulta foi de 59 meses (mínimo 18 e máximo 168). História de doenças atópicas foi observada em 38, enquanto 65 apresentavam sinais menores de atopia. A mediana de tempo entre o aparecimento das lesões e o diagnóstico foi de seis meses (mínimo duas semanas e máximo 30 meses). Na maioria, as lesões surgiram durante outono e inverno. Tratamento foi realizado em 79, e 90 destes utilizaram curetagem. Recidiva das lesões foi observada em 46, havendo relação entre a recidiva e a realização de curetagem (p=0,0092). Outros métodos utilizados foram hidróxido de potássio, sulfato de zinco e imiquimod. Conclusão: A faixa etária e distribuição entre os sexos foram semelhantes às descritas na literatura. O tempo entre o surgimento das lesões e o diagnóstico é extenso porque, embora diagnóstico e manejo possam ser realizados na atenção primária, muitos pacientes são diagnosticados por especialista, atrasando o início do tratamento e favorecendo a disseminação e transmissão do vírus. A alta prevalência de história e sinais de atopia, além da coincidência entre a sazonalidade do aparecimento das lesões com o período de exacerbação de doenças atópicas, sugere relação entre a infecção e atopia. O tratamento de escolha foi curetagem e, embora tenha sido encontrada relação entre curetagem e recidiva, a amostra limitada e o menor número de pacientes tratados com outros métodos podem ter influenciado este resultado.

http://anais.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/2-dermaped-simpsio-internacional-de-dermatologia/0065-avaliacao-epidemiologica-de-criancas-com-molusco.pdf