



Trabalhos Científicos

Título: Lesões Ungueais

Autores: MARIANA CANATO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); DANIELLE ARAKE ZANATTA (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); NARA FROTA ANDRÉ (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); IWYNA FRANÇA SOUZA GOMES VIAL (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); MARJORIE UBER (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); RENATA ROBL IMOTO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ); VÂNIA OLIVEIRA DE CARVALHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ)

Resumo: OBJETIVO: Apresentar aos congressistas diagnósticos diferenciais de alterações ungueais na infância de forma interativa. MÉTODOS: Sob forma de pôster, serão apresentadas imagens de diagnósticos diferenciais de lesões ungueais em crianças. O diagnóstico permanecerá oculto e, de acordo com a aparência das lesões e breve história clínica, os participantes poderão opinar sobre a hipótese diagnóstica. RESULTADOS: Líquen plano – Caracteriza-se por opacidade, adelgaçamento da lâmina ungueal e formação de estrias longitudinais. Em casos crônicos há lesão cicatricial com a formação de pterígio ou anoníquia. Pode preceder as alterações cutâneas da doença ou ocorrer isoladamente. O tratamento é realizado com corticóides tópicos de alta potência sob oclusão. Onicomicose – Infecção ungueal por dermatófitos, especialmente *Tricophyllum rubrum*. Ocasiona espessamento, porosidade e amarelamento da lâmina ungueal. O diagnóstico é confirmado por cultura de fungos e, em geral, o tratamento é sistêmico uma vez que a medicação tópica penetra pouco. Exostose subungueal – Tumoração óssea benigna (osteocondroma) que, primordialmente, ocorre na falange distal do primeiro pododáctilo. Ocasiona dor à palpação e leva a um deslocamento vertical da lâmina ungueal e, por vezes, descolamento. O exame radiológico confirma o diagnóstico e o tratamento é cirúrgico com curetagem da lesão. Psoríase – Caracteriza-se por onicodistrofia, pittings e onicolise. Como as alterações não são específicas da doença, o diagnóstico pode ser desafiador, portanto, a anamnese detalhada e a presença concomitante de lesões cutâneas permitem a confirmação do diagnóstico. CONCLUSÃO: A anamnese e o reconhecimento do aspecto da unha em cada doença são fundamentais para o correto diagnóstico e tratamento das alterações ungueais.