



**20° CONGRESSO
BRASILEIRO DE
Infectologia
Pediátrica**
DE 14 A 17 DE NOVEMBRO • SALVADOR/BA

Trabalhos Científicos

Título: Bartonelose E Esporotricose Como Causas De Síndrome Oculoglandular De Parinaud: Relato De 2 Casos

Autores: Thais Grodzicki Ambrus; Viviane Rinaldi Favarin Colás; Ana Carolina Dantas de Assis; Daniel Jarovsky; Flavia Jaqueline Almeida; Eitan Naaman Berezin

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A Síndrome Oculoglandular de Parinaud (SOGP) é caracterizada por conjuntivite granulomatosa unilateral e linfadenite ipsilateral (pré-auricular ou submandibular). Tem etiologia variável, sendo comuns a bactéria *Bartonella henselae* e o fungo dimórfico *Sporothrix schenckii*. O diagnóstico é baseado em achados clínicos e epidemiológicos, com testes sorológicos para confirmação do agente etiológico. Apresentaremos dois casos clínicos de (SOGP) decorrentes da infecção por esses dois agentes. **DESCRIÇÃO DO CASO CASO 1:** Paciente de 3 anos, saudável, com história de hiperemia, edema, prurido e secreção purulenta em olho direito há um mês. Apresentava lesão nodular em região malar ipsilateral de $\pm 0,5$ centímetros, linfonodomegalia cervical ipsilateral sem sinais flogísticos (maior linfonodo medindo ± 3 centímetros), sem outros sintomas acompanhantes. Referia contato íntimo com gato que apresentou esporotricose tratada inadequadamente. O diagnóstico definitivo foi realizado a partir da cultura de biópsia do linfonodo acometido. Iniciado tratamento com itraconazol durante 6 meses, apresentando melhora dos sintomas 2 meses após início do tratamento. **CASO 2:** Paciente de 13 anos, saudável, apresentava quadro de hiperemia, edema, prurido e secreção purulenta em olho esquerdo há 8 dias. Concomitantemente, apresentou linfonodomegalia cervical, retroauricular e submandibular ipsilateral ao olho acometido, sem sinais flogísticos associados. Convivia com três gatos e um cachorro. Realizado diagnóstico sorológico de infecção por *Bartonella henselae*, sendo realizado tratamento com azitromicina por 14 dias, com melhora gradual dos sintomas. **COMENTÁRIOS** A esporotricose é transmitida através de inoculação cutânea do organismo, secundário a trauma durante trabalhos ao ar livre ou pela arranhadura de animais contaminados São pápulas ou nódulos, que variam de milímetros até cerca de quatro centímetros, que podem evoluir para úlceras, indolores, geralmente nos membros ou face. Bartonelose é comumente caracterizada por linfadenite regional e é transmitida por inoculação da bactéria através da arranhadura ou lambidura do gato infectado (especialmente filhotes) em mucosas ou ferimentos. Na maioria dos pacientes, é uma doença auto-limitada, com resolução em até 4 meses. As duas doenças são as causas mais comuns de Síndrome Oculoglandular de Parinaud, e devem ser investigadas a depender da apresentação clínica e etiologia compatível.