



**20° CONGRESSO
BRASILEIRO DE
Infectologia
Pediátrica**
DE 14 A 17 DE NOVEMBRO • SALVADOR/BA

Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Parinaud/ Bartonelose Ocular; O Risco Inocente.

Autores: Valter Pinho dos santos; Deborah Ascar Requena Perez; Roberta Oliveira Rebecchi; Alessandra Radin; Fernanda Campos; Caroline Pedroso

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A Síndrome Oculoglandular de Parinaud é caracterizada por conjuntivite granulomatosa unilateral e adenopatia homolateral. É associada a diversas doenças infecciosas, mais frequentemente a doença da arranhadura do gato causada (DAG) pela Bartonella henselae. O sítio de inoculação é a conjuntiva ocular ou pálpebra por lambedura ou arranhadura de gato. Apresenta-se com hiperemia conjuntival, enftamento ganglionar pré auricular homolateral podendo ocorrer sintomas sistêmicos como febre. Ao exame verifica-se nódulo granulomatoso em conjuntiva palpebral, eritematoso ou amarelado medindo até 1cm de diâmetro. O diagnóstico da infecção é clínico, com confirmação laboratorial. Usualmente há resolução do quadro até 4 meses sem sequelas podendo raramente evoluir com neurorretinite. O tratamento é controverso. **DESCRIÇÃO:** Paciente masculino, 9 anos previamente hígido procurou serviço de oftalmologia de urgência em hospital municipal referindo há 15 dias quadro de febre por 2 dias, cefaleia de forte intensidade seguida de ptose palpebral e saída de secreção em olho direito. Concomitante verificou aparecimento de linfonodo cervical ipsilateral assim como edema pré auricular. Encaminhado para serviço de referência havendo melhora dos sintomas sem tratamento. Ao exame oftalmológico verificado ecto edema de olho direito e lesão conjuntival localizada em fórnice nasal de coloração rósea e de aspecto irregular. Coletados exames gerais sem alterações, sorologias monolike e HIV negativas e sorologia para Bartonella hanseale positiva (imunofluorescência direta IgG 1:400 e IgM 1:10). A tomografia de abdome verificou hepatoesplenomegalia homogênea e tomografia cervical adenomegalia. Epidemiologicamente possuía 3 gatos domésticos e referia o hábito de dormir com os gatos sendo frequentemente arranhado e lambido no rosto pelos mesmos. Optado por não introduzir tratamento específico uma vez que apresentou melhora clínica progressiva. Paciente segue em acompanhamento clínico sem alterações visuais até o momento. **COMENTARIOS:** A doença da arranhadura do gato é uma infecção subaguda, habitualmente autolimitada, provocada pelo bacilo Gram-negativo Bartonella henselae. A Síndrome de Parinaud é uma manifestação atípica mais frequente em crianças. Apresenta critério diagnósticos que incluem: contato com gatos; sorologia negativa para outras causas de adenopatia, sorologia positiva para Bartonella henselae; Biópsia ganglionar com inflamação granulomatosa compatível. O caso é considerado confirmado se três critérios forem positivos. A complicação mais temida é a Neuropatia óptica caracterizada por perda súbita a crônica da visão devido à disfunção do nervo óptico. Apesar do tratamento da em imunocompetentes ser controverso o uso de antibióticos sistêmicos pode encurtar a duração da doença e acelerar a recuperação visual.