Trabalhos Científicos

Título: Acidente Vascular Isquêmico Na Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica

Autores: Camila Ohomoto de Moraes / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Giovanna Guazzelli Guerra / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Samantha Faria de Matos / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Marcus Vinicius Vidal Martuchelli / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Daniel Jarovsky / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Flavia Jacqueline Almeida / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Marco Aurélio Palazzi Sáfyadi / Irmandade da Santa Casa de São Paulo; Eitan Naaman Berezin / Irmandade da Santa Casa de São Paulo;

Resumo: Desde os primeiros trabalhos publicados de infecção pelo Sars-Cov-2 notou-se que a população pediátrica não era tão acometida como nos casos de outras infecções virais. Na maioria dos casos, apresentam-se como assintomáticas ou oligossintomáticas na infecção aguda. Em contrapartida, foram descritos na população pediátrica os casos de Síndrome Inflamatória Multissistêmica (PIM-S) associada à Covid-19. O caso descrito é de uma criança de 8 anos de idade, sexo feminino, previamente hígida, que apresentou um quadro de acidente vascular isquêmico, como manifestação neurológica na PIM-S. A paciente em questão iniciou com quadro de febre e cervicalgia. No 2º dia do início dos sintomas, recebeu diagnóstico de amigdalite, sendo prescrito amoxicilina. No 7º dia de tratamento, mantinha febre diária e evoluiu com hemiplegia a esquerda. Quando admitida no serviço de emergência de um hospital terciário evoluiu com quadro de choque hipovolêmico, sendo o mesmo refratário à volume e com necessidade de drogas vasoativas. Inicialmente aventado a hipótese de meningite, todavia em tomografia de crânio observadas áreas hipodensas em lobo parietal direito e núcleo capsular, que caracterizavam acidente vascular isquêmico. O pai da paciente havia sido diagnosticado com Covid-19 através da técnica de PCR, 40 dias antes do início dos sintomas da paciente. Além do vínculo epidemiológico e febre, a paciente apresentava também aumento das provas inflamatórias, troponina e d-dímero. Não foram isolados agentes em culturas realizadas, sendo descartados outros diagnósticos diferenciais. Além disso, foi confirmada a hipótese de PIM-S através da sorologia (IgG e anticorpos neutralizantes reagentes para Sars-Cov-2). Como terapêutica, recebeu imunoglobulina humana (IVIG), dose de 2g/kg, no 3º dia de hospitalização, além de anticoagulação e antibioticoterapia inicial com ceftriaxone e clindamicina até os resultados finais de culturas. Após infusão de IVIG, mantinha febre, sendo então optado pela associação de corticoterapia ao esquema de terapêutico, com resolução da mesma. Recebeu alta no 17º dia de hospitalização e teve anticoagulação mantida por 6 meses. Evoluiu com melhora da hemiplegia, todavia ainda mantém perda de força em hemicorpo esquerdo. No momento ainda realiza reabilitação motora e segue em acompanhamento ambulatorial.