



Trabalhos Científicos

Título: Associação Entre O Tabagismo Materno Com O Baixo Peso Ao Nascer, Em Hospital De Referência Do Sus De Curitiba.

Autores: ANA PAULA RIZZO TROTTA (UNIVERSIDADE POSITIVO); PAULA MOREIRA YEGROS (UNIVERSIDADE POSITIVO); BIANCA CESARIO CAVICHIOLLO (UNIVERSIDADE POSITIVO); ANTONIO CARLOS CANTO TOMAZINI (UNIVERSIDADE POSITIVO); CAMILA DOS SANTOS DE ARAUJO (UNIVERSIDADE POSITIVO); CRISTINA OKAMOTO (UNIVERSIDADE POSITIVO)

Resumo: INTRODUÇÃO: O tabagismo é uma dependência química que está relacionada com diversas doenças. O uso de cigarros durante a gestação é responsável pelo aumento da taxa de abortos, partos pré-termo, baixo peso ao nascer e, até mesmo, morte perinatal. OBJETIVO: Avaliar o perfil de puérperas e determinar a prevalência de tabagismo nestas pacientes e sua correlação com baixo peso ao nascer nos recém nascidos. METODOLOGIA: Estudo transversal realizado através da revisão de prontuários e entrevistas com todas as puérperas atendidas em uma Maternidade de Curitiba, PR, no período de dois meses em 2010. Os critérios de inclusão foram parturientes híidas, com gestação a termo, sem intercorrências durante o pré-natal ou parto e que assinaram o termo de consentimento esclarecido. Foram excluídas pacientes que desenvolveram, durante a gravidez, patologias relacionadas ao crescimento intrauterino restrito. RESULTADOS: A análise foi composta por 219 pacientes sendo que 36 eram gestantes fumantes e 107 gestantes não fumantes. Houve um predomínio de gestantes provenientes de Curitiba (85%), fototipo morena-clara (40%), solteiras (53,4%), 1º grau incompleto (27,4%) e renda mensal acima de 760 reais (80%). Cerca de 60% das tabagistas convivem com fumantes nas suas casas. Dentre elas, 30% fizeram menos que 6 consultas de pré-natal. O baixo peso ao nascer foi encontrado em 8,3% das tabagistas, ocorrendo em apenas 2,8% das não tabagistas. CONCLUSÕES: As gestantes fumantes tiveram três vezes mais bebês com baixo peso ao nascer do que as não fumantes, com predominância entre mulheres solteiras com baixa escolaridade e baixa renda e que convivem na presença de outros fumantes.