



Trabalhos Científicos

Título: Toxoplasmose Fetal: Achados Ultrassonográficos Intracranianos

Autores: LÍVIA TERESA MOREIRA RIOS (UFMA); MARÍLIA DA GLÓRIA MARTINS (UFMA); PATRÍCIA FRANCO MARQUES (UFMA); MARYNÉA DO VALE NUNES (UFMA); SÍLVIA HELENA CAVALCANTE DE SOUSA (UFMA); AMANDA MENDES COSTA CAMPELO (UFMA); AMANDA FERREIRA PASSOS (UFMA); JULIANA LUCENA DOS SANTOS (UFMA); CAMILA CARVALHO DE SOUZA AMORIM MATOS (UFMA); GABRIELA CIRQUEIRA DE SOUZA BARROS (UFMA)

Resumo: **INTRODUÇÃO:** A toxoplasmose aguda na gestação pode acarretar infecção congênita, submetendo o feto a uma síndrome clínica com comprometimento multivisceral, de gravidade variada. **OBJETIVOS:** Relatar os achados ultrassonográficos antenatais e neonatais do comprometimento encefálico pela toxoplasmose em gestante com soroconversão no segundo trimestre. **MÉTODOS:** Relato de caso. **Descrição do caso:** A.C.C.P., 21 anos, G1P0A0, encaminhada ao setor de ultrassonografia do Hospital Materno Infantil, com relato de gestação de 33s2d, cursando com hidrocefalia fetal e oligohidramnia. Não apresentou anormalidades no pólo cefálico em exames prévios. Exames realizados no início do segundo trimestre revelaram imunização para citomegalovirose e rubéola, porém imunoglobulinas negativas para toxoplasmose. Sorologia realizada após o diagnóstico de hidrocefalia revelou IgM positiva para toxoplasmose com avidéz baixa. Novo exame ultrassonográfico com 35 semanas revelou colpocefalia e calcificações intracranianas periventriculares. Ruptura prematura de membranas com 36s5d desencadeou parto pré-termo vaginal. Ultrassonografia transfontanelar confirmou os achados antenatais, além de demonstrar pequenos cistos encefálicos corticais. Sorologias positivas para toxoplasmose do neonato confirmaram o diagnóstico. **DISCUSSÃO:** O risco de infecção congênita, quando a soroconversão ocorre no segundo trimestre está entre 15-50%, aumentando à medida que a idade gestacional avança, embora com menor gravidade, na maioria das vezes. Os achados ultrassonográficos intracranianos típicos são de dilatação dos cornos occipitais dos ventrículos laterais, colpocefalia, calcificações adjacentes às paredes ventriculares e pequenos cistos porencefálicos corticais, os quais foram evidenciados neste caso. **CONCLUSÃO:** A toxoplasmose assume relevância durante a gestação pelo risco elevado de comprometimento fetal. Dentre os comprometimentos, estão as alterações encefálicas, descritas neste relato de caso, que são passíveis de diagnóstico ultrassonográfico antenatal.