



Trabalhos Científicos

Título: Desenvolvimento Neuropsicomotor De Crianças Prematuras Egressas Do Método Canguru Em Hospital Universitário

Autores: CLAUDIA MARTINS GONÇALVES (HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO- SP DISCIPLINA DE PEDIATRIA NEONATAL); EDNA MARIA ALBUQUERQUE DINIZ (DISCIPLINA DE PEDIATRIA NEONATAL, DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FMUSP); ALEXANDRE FERRARO (DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DA FMUSP); SUELI VILA NOVA BARBOZA (HOSPITAL MUNICIPAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO- SÃO PAULO)

Resumo: Introdução: O acompanhamento do Desenvolvimento Neuropsicomotor (DNPM) de Recém-Nascidos Pré-termo de muito baixo peso (RNPT-MBP) alimentados com leite humano e egressos do Método Canguru (MC) que é um tipo de assistência neonatal humanizada, são importantes para o conhecimento do desempenho neuropsicomotor desses RN. Objetivos: 1- Descrever o DNPM de RNPTMBP, através do teste de triagem Denver II aos 12 meses de idade, que participaram do MC e receberam leite humano e/ ou materno, durante todo o período de internação. 2- Verificar o DNPM através do teste Denver II de acordo com o tempo de aleitamento materno. Metodologia: Cinquenta e quatro (54) crianças egressas do Canguru foram acompanhadas em Ambulatório de Seguimento com consultas periódicas por equipe multiprofissional composta de médica nutróloga, fisioterapeuta, assistente social e psicóloga. Essas crianças foram submetidas ao teste de triagem Denver II com um ano de idade corrigida. Resultados: A amostra apresentou medianas, peso de nascimento e idade gestacional, de 1316g (DP 306,6 g) e 32 semanas (DP 2,6) respectivamente. A mediana da idade materna foi de 28 anos (DP 7,7), ensino fundamental completo com nove anos de estudo e a renda per capita de R\$150,00 (DP 202,6). Em relação ao DNPM dos 54 RNMBP, que foram classificados pelo teste de triagem Denver II aos 12 meses de idade, constatamos que 37% das crianças apresentaram risco no desempenho neuropsicomotor, na idade de um ano corrigida. Em nossa amostra, as crianças que foram amamentadas por mais tempo (meses) tiveram menos risco para o desempenho neuropsicomotor. No estudo alcançamos a mediana em aleitamento materno de sete meses com percentil 25 (3 meses) e percentil 75 (18 meses). Conclusão: O tempo de aleitamento materno e o egresso do método Canguru dos RNPTMBP foram importantes no desempenho do DNPM. Constatamos ainda que a equipe multiprofissional, capacitada foi de grande importância para a promoção, proteção e apoio a amamentação precoce dos RN prematuros internados nas unidades de tratamento intensivo, e sua continuidade após alta hospitalar.