



Trabalhos Científicos

Título: Tempo De Clampeamento Do Cordão Umbilical, Em Partos Normais, Em Uma Maternidade Referência Do Sus No Estado Da Paraíba.

Autores: FLÁVIO AUGUSTO LYRA TAVARES DE MELO (INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS); CLÁUDIO TEIXEIRA RÉGIS (INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS); JULIANA DE SOUSA SOARES (INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS); KELLINE PEREIRA COELHO (INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS); SHAMYA LEWIS SAAD RACHED (INSTITUTO CÂNDIDA VARGAS)

Resumo: Introdução: A prática do clampeamento do cordão umbilical partir de 1 (um) a 3 (três) minutos após o desprendimento do concepto tem sido preconizada recentemente na assistência ao recém nascido. Os benefícios dessa prática na assistência ao parto, já são embasados por diversos estudos em perinatologia baseada em evidências, e se revelam a curto, médio e longo prazos. Objetivos: Avaliar o tempo de clampeamento do cordão umbilical, em partos normais, em uma maternidade referência do SUS na Paraíba. Inferir se a prática do clampeamento tardio do cordão umbilical tem sido utilizada na assistência ao parto. Métodos: Durante os partos normais realizados na referida maternidade, os dados foram aferidos por um observador independente, não vinculado à equipe assistencial. O instrumento de aferição do tempo utilizado foi um cronômetro digital e os dados obtidos analisados pelo software Epi-Info. Resultados: Foram avaliados 88 (oitenta e oito) nascimentos no mês de julho de 2012. O tempo médio de clampeamento do cordão umbilical foi de 53,9 segundos, mediana de 47 segundos e modo de 37 segundos. Conclusão: De acordo com os dados obtidos não foi observado o tempo de clampeamento do cordão umbilical que é preconizado nas rotinas de assistência ao recém nascido na atualidade. São necessárias medidas de conscientização, para que esta prática benéfica seja adotada nos serviços perinatais de referência.