



Trabalhos Científicos

Título: Pentologia De Cantrell - Relato De Caso

Autores: FRANCIELLY SANTOS (MATERNIDADE CARMELA DUTRA); THAISE SONCINI (MATERNIDADE CARMELA DUTRA); RICARDO AMORIM (MATERNIDADE CARMELA DUTRA)

Resumo: INTRODUÇÃO A síndrome ou Pentologia de Cantrell é uma entidade rara, caracterizada por malformações da porção inferior do esterno, região ventral do diafragma e linha média abdominal, associada a anomalias cardíacas. RELATO DO CASO L.P.I., recém-nascido do sexo feminino, branca, mãe com 35 anos, primigesta, realizou sete consultas de pré-natal, sorologias negativas, tipagem sanguínea: A+, sem intercorrências na gestação. Com 25 semanas foi diagnosticada com a Síndrome/Pentologia de Cantrell por US morfológico. O Ecocardiograma Fetal realizado uma semana antes do parto revelou coração desviado para a direita, mesocárdico, recoberto por pericárdio, ventrículo único tipo esquerdo com dupla via de saída e de entrada de VE, artéria pulmonar posterior e à esquerda, aorta de calibre aumentado, anterior e à direita. Com 39 semanas e dois dias de idade gestacional por uma US de 13 semanas e seis dias, foi realizada cesariana, bolsa rota no ato cirúrgico, líquido amniótico claro, apresentação cefálica, sexo feminino, peso de nascimento: 2.780g, Apgar 2/2. Ao exame físico, apresentava ausência de arcos costais à esquerda, tórax e abdome abertos, com exposição de coração, fígado e alças intestinais. Foi a óbito com aproximadamente 10 minutos de vida. CONCLUSÃO A síndrome é usualmente detectada ao nascimento, constituindo-se, ainda hoje, em um desafio cirúrgico pela complexidade das malformações congênitas presentes, as quais determinam uma baixa expectativa de vida. Este caso ilustra a gravidade de uma doença com incidência muito baixa, mas de resolução extremamente difícil, apesar dos avanços na medicina atual. Por esta razão, o cuidado e o acompanhamento pré-natal são cruciais para estabelecer um diagnóstico precoce destas anormalidades, para que, além do aconselhamento dos pais, possa haver o encaminhamento da gestante a um centro especializado e aumentando assim a chance de sobrevivência do recém-nascido.