



21º CONGRESSO BRASILEIRO DE

PERINATOLOGIA

14 A 17 DE NOVEMBRO DE 2012

CENTRO DE CONVENÇÕES EXPO UNIMED | CURITIBA - PR

Trabalhos Científicos

Título: A Influência Do Teste Rápido Anti-hiv Sobre A Liberação Do Aleitamento Materno

Autores: LÃ°CIA DE FÃ;TIMA GARCIA VELOSO (UNIGRANRIO); RENAN SCHEIDEGGER CARDOSO (UNIGRANRIO)

Resumo: IntrduÃ§Ã£o: A epidemia de aids tem apresentado taxas de incidÃªncia crescentes passando a ser problema cada vez mais importante na saÃºde pÃºblica. Considerando que o aleitamento materno representa risco adicional de transmissÃ£o do HIV estimado entre 7 e 22%, a partir de 2007, o MinistÃ©rio da SaÃºde passou a recomendar o teste anti-HIV no primeiro e terceiro trimestres de gestaÃ§Ã£o, orientando que as mÃeas com diagnÃstico HIV positivo deverÃ£o ser aconselhadas a nÃ£o amamentar. Para a gestante que desconhece este resultado, a recomendaÃ§Ã£o de 2009, Ã© que se realize o teste rÃpido anti-HIV ao chegar Ã maternidade, mas a demora no resultado deste teste, pode caracterizar um problema para o pediatra assistente em relaÃ§Ã£o Ã liberaÃ§Ã£o do aleitamento materno. Objetivos: estimar as curvas de tempo entre o nascimento e a primeira mamada dos bebÃas nascidos em um hospital pÃºblico do Estado do Rio de Janeiro, avaliar o tempo de realizaÃ§Ã£o do teste rÃpido anti-HIV e quantificar a demora na liberaÃ§Ã£o dos resultados do teste rÃpido nos casos em que este exame foi entregue apÃs o nascimento. MÃtodos: Foi realizado um estudo de coorte prospectivo, entre agosto de 2011 e agosto de 2012, tendo como evento inicial o nascimento e como desfecho, a primeira mamada. As informaÃ§Ães foram colhidas atravÃs de um questionÃrio semi-estruturado aplicado Ãs 90 puÃrperas do perÃodo selecionado. A pesquisa foi aprovada pelo ComitÃa de Ãtica em Pesquisa. Resultados: Os resultados revelaram um tempo mÃdio de 5 horas e 13 minutos entre o nascimento e a primeira mamada ao seio materno, uma mÃdia de realizaÃ§Ã£o do teste rÃpido anti-HIV de 1 hora e 19 minutos e uma demora de 4 horas e 46 minutos para a liberaÃ§Ã£o do resultado nos casos em que este resultado foi liberado somente apÃs o nascimento. ConclusÃo: a demora na execuÃ§Ão deste exame pode acarretar em grande impacto sobre a decisÃo do pediatra em liberar o aleitamento materno.