



Trabalhos Científicos

Título: Lesões Orais Atípicas Em Recém-nascido - Relato De Caso

Autores: LEANDRA SILVA CHAVES (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA); MARIA FERNANDA SIMAS (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA); MARGARETE HANDAM (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA); MARIA CLÁUDIA LUZ (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA); PATRÍCIA RIBEIRO DE OLIVEIRA (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA); PRISCILA PINHEIRO RIBEIRO LYRA (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA); LÍCIA MARIA OLIVEIRA MOREIRA (UNIDADE DE PEQUENOS LACTENTES - CENTRO PEDIÁTRICO PROF. HOSANHAH DE OLIVEIRA - UFBA)

Resumo: Introdução: Lesões de tecidos moles da cavidade oral podem estar relacionadas a doenças periodontais, infecções locais ou sistêmicas potencialmente tratáveis. Objetivo: Descrever caso com apresentação atípica de lesão oral e chamar atenção para necessidade de realização de investigação etiológica. Relato de caso: Paciente A.V. R. A., sexo feminino, 29 dias, previamente hígida, com história de sintomas respiratórios de via superior por 3 dias, evoluindo com quadro súbito de choro intenso, cianose e desconforto respiratório. Procurou serviço médico onde foi feita suspeita de broncoaspiração e introduzido antibioticoterapia. Havia relato de quadro sugestivo de crise convulsiva (hipertonia). Evoluiu com distúrbio de coordenação sucção/deglutição. História prévia de aleitamento materno exclusivo e ganho ponderal de +/- 26g/dia. Foi transferida para a unidade médica de referência com quadro de desconforto respiratório e sialorréia importante, em uso de antibioticoterapia, acompanhamento com fisioterapia respiratória e fonoaudiologia. Apresentava na admissão lesão escurecida, de aspecto necrótico em palato, sendo feita suspeita de fenda palatina submucosa, confirmada em tomografia, de melhora espontânea. Genitora evoluiu com lesões vesiculares em região zigomática à direita e antebraço direito, sugestivo de Herpes Simples tendo sido tratada com aciclovir oral. Lactente evoluiu com duas lesões ulceradas de bordas hiperemiadas em palato bilateralmente, 3 dias após o aparecimento das lesões cutâneas maternas (estava com idade cronológica de 1 mês e 15 dias). Realizada citologia da lesão com laudo de processo inflamatório agudo, sorologia do binômio para H. Simples na admissão IgG materna maior que a do lactente, IgM negativas. Estudo do liquor normal. Introduzido aciclovir venoso por 10 dias devido ao aspecto da lesão, com regressão da lesão no 5º dia de tratamento. Colhida nova sorologia para Herpes do binômio, ainda sem resultado. Lactente em melhora do distúrbio de deglutição, em treinamento com a fonoaudiologia, em uso de fenobarbital e em investigação para causa das crises convulsivas. Conclusão: Paciente com lesão oral sugestiva de Herpes simples, com provável infecção aguda em período precoce (RN/lactente jovem) e de apresentação clínica atípica (materna e da paciente). Devido à possibilidade de vários diagnósticos diferenciais de lesões orais na infância, é de grande importância o diagnóstico e acompanhamento clínico para tratamento precoce.