22º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL
de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Análise Psicofísica Da Escala Multidimensional De Dor Neonatal Pain, Agitation And Sedation Scale (n-pass) Em Recém-nascidos.

Autores: TATIANE MELO DE OLIVEIRA (HMIB); MARCOS VINÍCIUS MELO DE OLIVEIRA (UNB); ROSANA MARIA TRISTÃO (UNB); PAULO ROBERTO MARGOTTO (HMIB); JOSÉ ALFRELDO LACERDA DE JESUS (UNB)

Resumo: Introdução: A dor no recém-nascido continua sendo um campo extenso de pesquisa e necessita dos parâmetros fisiológicos e comportamentais para serem identificados. A escala de dor N-PASS tem como objetivo avaliar o grau de sedação ou a presença de dor e agitação no recém-nascido. Validar uma escala depende da confiabilidade no momento de sua utilização. Uma das formas de validação é a avaliação dos parâmetros psicofísicos da dor. Objetivo: Validar por meio dos parâmetros psicofísicos, a escala multidimensional de dor N-PASS, sob o ponto de vista da intensidade, direção, inclinação e regulação. Métodos: Estudo observacional, analítico e de coorte realizado em 2011 com 33 recém-nascidos. Os escores da escala N-PASS foram pontuados três minutos antes do procedimento doloroso, imediatamente após o procedimento doloroso e três minutos após o procedimento doloroso. Resultados e Discussão: Os indicadores Irritabilidade/Choro e o Estado Comportamental apresentaram relação com intensidade, direção, inclinação, reatividade e regulação. Já Expressão Facial e o Tônus dos Membros só não apresentaram relação com direção e inclinação. Os Sinais Vitais apresentaram apenas relação com intensidade. A escala N-PASS, de uma forma geral, apresentou relação com a reatividade, a regulação e a intensidade e não apresentou relação com a direção e com a inclinação. A análise da dor, pela escala N-PASS como um todo, quando os sinais vitais foram retirados, manteve a qualidade da avaliação. Conclusão: A escala de dor N-PASS mostrou ser um excelente indicador de dor aguda na faixa etária proposta, com boa aplicabilidade na prática.

http://www.sbp.com.br/trabalhos-de-congressos-da-sbp/22-congresso-brasileiro-de-perinatologia/0041-analise-psicofisica-da-escala-multidimensional-de.pdf