



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Sirenomelia - Relato De Caso E Revisão Literaria

Autores: ESIQUIEL MIRANDA (USP); NATALIE DE OLIVEIRA AMARAL (FAMESP/USP); ELLEN RODRIGUES TEIXEIRA (FAMESP RESIDENTE); AMANDA WATANABE BERNADINELLI (FAMESP RESIDENTE)

Resumo: Sirenomelia ou síndrome da sereia é uma malformação congênita extremamente rara, com incidência de aproximadamente 1 a cada 100.000 nascidos vivos. A característica principal dessa condição é a fusão dos membros inferiores formando um membro único em linha média, e pode estar associada com outras anomalias; como agenesia urogenital e gastrointestinal inferior, alterações vertebrais e sacrais; que tornam a síndrome incompatível com a vida. O objetivo deste estudo é relatar um caso de sirenomelia ocorrido na cidade de Bauru, em São Paulo, Brasil, correlacionando os achados no paciente com uma revisão bibliográfica sobre o assunto. Gestante de 18 anos GIII e PII, realizou primeira ultrassonografia (USG) com 11 semanas de gestação, não apresentando anormalidades. USG seguinte, realizada na 30ª semana de gestação, com diagnóstico de oligodramnia acentuada, restrição do crescimento intrauterino (RCI) e placenta grau III, sem demais alterações relatadas. História familiar negativa para malformações, casal não consanguíneo, realizadas 4 consultas de pré natal, sorologias negativas durante a gestação. Apresentou infecção do trato urinário não tratada por volta da 11ª semana de gestação. Paciente nega patologias prévias, uso de drogas ou medicações diárias. Parto cesariano de feto único na 30ª semana, recém nascido (RN) pesou 1.060 kg, perímetro cefálico 27 cm, estatura 32 cm e APGAR 3/8. Foi realizada intubação orotraqueal e uso de surfactante na sala de parto. Ao exame físico apresentava fácies sindrômica, cianose central e periférica, taquipnéia com tiragem subcostal, subdiafragmática e batimento de asa de nariz associado a roncos esparsos. À ausculta cardíaca ritmo cardíaco regular, em 2 tempos, bulhas normofonéticas sem sopros. Abdome flácido, depressível, ausência de visceromegalias e artéria umbilical única. Aparelho genitourinário sem pertuitos e presença de membro inferior único fusionado. Ocorreu o óbito após 48 horas de vida. Embora rara, a sirenomelia é um distúrbio que merece estudos mais aprofundados, sobretudo a respeito de sua etiopatogenia e condução do caso, pois não existe um consenso a respeito do modo de atuação perante esta alteração.