22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título:

Autores: LORRANY ROSA VIOLA (FACIPLAC); MARCO VINÍCIUS FERNANDES (FACIPLAC); ANDREA LOPES RAMIRES KAIRALA (FACIPLAC); ELIANE DE MELO TELES (HOSPITAL REGIONAL DO GAMA); RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS (HOSPITAL REGIONAL DO GAMA)

Resumo: Introdução: A onfalocele é uma anomalia congênita de má rotação do intestino com persistência da hérnia do conteúdo abdominal na parte proximal do cordão umbilical. Sua incidência é de até 1:5.000 nascimentos. Objetivo: Mostrar a importância da ultrassonografia fetal e a sua correlação com as alterações anatômicas presentes ao nascimento. Relato de Caso: Estudo descritivo, dados coletados em uma instituição pública do DF, por meio de análise de evoluções e resultados de exames clínicos e laboratoriais presentes no prontuário do paciente. FMM 39 anos, casada, G1P0A0, na 14ª semana de gestação foi submetida a uma USG, sem detecção de qualquer tipo de alteração. A partir da 31ª semana, a USG identificou defeito na parede abdominal tipo onfalocele, associado a comunicação interventricular. O parto cesáreo foi realizado com 37 semanas por pre-eclâmpsia. RN, sexo feminino, Peso:1.100g e Est:43cm, Apgar 2/3, implantação baixa de orelhas, grande onfalocele e pâncreas torto à direita; encaminhada imediatamente à UTI neonatal com sítio 2 horas após o nascimento. Resultados: Nas onfaloceles extensas, com hérnia de fígado e alças intestinais, o defeito pode ser o resultado da interrupção no desenvolvimento dos folhetos laterais e de falha no fechamento da parede, por volta da 3ª ou 4ª semanas de vida embrionária, secundário à exposição a agentes teratogênicos ou alterações genéticas que predisponham ao desenvolvimento de malformações. A incidência de anomalias cromossômicas é maior na presença de outras malformações, passíveis de identificação ultrassonográfica, como no presente estudo. A ultrassonografia evidenciou massa protusa externa envolta por uma membrana amniótica e contendo alças intestinais hiperecogênicas e fígado. Conclusão: O manejo inicial entre o nascimento e a correção cirúrgica tem por objetivo manter o saco da onfalocele íntegro, estável e preservar a temperatura corporal e (importante) a colocação de sonda gástrica, para prevenir a distensão abdominal. O tratamento a ser escolhido deve considerar: dimensões do defeito, presença ou ausência de saco herniário, prematuridade ou baixo peso do RN e presença de anomalias associadas. O tratamento cirúrgico de melhor aplicação é a bolsa de silástico, descrita por Schuster, em 1967.