



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Interferência Da Assistência Pré-natal Na Prematuridade

Autores: MARIA JULIANI BARRA COELHO (HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO); MÁRCIA SALDANHA DOS SANTOS MOURA (HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO); LEONORA QUEIROZ OLIVEIRA RICCIO (HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO); BIANCA FONSECA GOMES (HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO); FÁTIMA MARIA CAMPINHO PINHEIRO (HOSPITAL FEDERAL DE BONSUCESSO)

Resumo: INTRODUÇÃO: O acompanhamento nas consultas pré-natais é de significativa importância ao recém-nascido, pois a falta de seguimento da gestação impõe vários riscos ao concepto, dentre eles a prematuridade. OBJETIVO: Observar que o número de consultas pré-natal abaixo do limite ideal ou a ausência de acompanhamento da gestante está associado a um maior risco de trabalho de parto prematuro com peso inferior a 1500g. MÉTODOS: A amostra foi composta da totalidade dos prematuros vivos (140) e suas respectivas mães (127), excluídas as mães de nascidos mortos, no período de janeiro de 2013 a julho do ano de 2014. A pesquisa se baseia na coleta do número de consultas pré-natais obtidas através de prontuários de recém-nascidos com peso de nascimento inferior a 1500g, demonstrando o número médio de consultas no segundo e terceiro trimestre de gestação RESULTADOS: Entre os pré-maturos de muito baixo peso nascidos no 2º trimestre de gestação, 65,5% das gestantes realizaram de 0 a 2 consultas pré-natais e 34,4% das gestantes realizaram 3 ou mais consultas pré-natais. Entre os pré-maturos de muito baixo peso nascidos no 3º trimestre de gestação, 78,3% das gestantes realizaram de 0 a 4 consultas pré-natais e 21,6% das gestantes realizaram 5 ou mais consultas pré-natais. CONCLUSÃO: A assistência pré-natal adequada fornece o diagnóstico para que seja feito o tratamento de inúmeras patologias que podem acometer a gestante, obtendo durante a gestação redução ou eliminação de fatores risco passíveis de serem corrigidos, evitando assim, o risco da prematuridade e suas consequências.