



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Meningoencefalite Herpética No Período Neonatal: Relato De Caso

Autores: GIOVANA MARIOTO PELIZARI (UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA); MURILO SABBAG MORETTI (UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA); GABRIELA REIGOTA BLANCO (UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA)

Resumo: INTRODUÇÃO: O risco de transmissão vertical do herpes vírus é maior quando a mãe apresenta infecção primária no terceiro trimestre de gestação. A clínica pode ser de infecção disseminada ou localizada, como no sistema nervoso central, com alteração líquórica. OBJETIVO: Relatar um caso de meningoencefalite herpética em um recém-nascido com 15 dias de vida. MÉTODOS: Realizada revisão da literatura sobre o assunto e relato do caso após revisão de prontuário. RESULTADOS: Recém-nascido com 15 dias de vida, encaminhado de outro serviço à UTI neonatal com quadro um dia de febre e convulsão. Realizada investigação laboratorial e de imagem, que mostrou alteração do líquido (pleocitose + proteinorquia) e tomografia de crânio normal, sendo iniciado tratamento para meningite neonatal. Ao final do tratamento antimicrobiano, apresentou recidiva do quadro febril, sendo colhido novo líquido (pleocitose + proteinorquia importante), sendo alterado esquema antimicrobiano e realizada nova tomografia que evidenciou acentuada hipodensidade da substância branca de modo difuso e simétrico. Ampliada a investigação com ressonância de crânio (sinais de hipovascularização difusa do parênquima encefálico relacionada a edema, compatível com encefalite) e sorologias para infecções congênicas (herpes IgG e IgM positivos). Iniciado portanto tratamento com aciclovir, mantido por 10 dias. CONCLUSÃO: O caso relatado mostra uma infecção por herpes no período neonatal, de difícil suspeita diagnóstica, de evolução grave conforme relatado na literatura. Diferente do encontrado nas revisões, este paciente não apresentou lesão de pele antes do acometimento do sistema nervoso central.