



# 22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES  
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF  
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

## Trabalhos Científicos

**Título:** Perfil Dos Recém-nascidos Atendidos Na Terceira Etapa Do Método Canguru: Avaliação De Uma Iniciativa Recente

**Autores:** BRIZA CLAUDIAMARA REGO ROCHA (MATERNIDADE MUNICIPAL DR. MOURA TAPAJOZ - MANAUS/AM); ALEXANDRE LOPES MIRALHA (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS); PRISCYLA FERREIRA PEQUENO LEITE (MATERNIDADE MUNICIPAL DR. MOURA TAPAJOZ - MANAUS/AM); GISELLE EUGÊNIA PEREIRA IZEL (UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS)

**Resumo:** Introdução: O nascimento de um recém-nascido de baixo peso (inferior a 2500 gramas), sem considerar a idade gestacional, constitui por si só um importante fator de morbimortalidade neonatal. O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para a melhoria da qualidade do cuidado com o recém-nascido de baixo peso sendo desse modo desenvolvido em etapas: UTI Neonatal, enfermaria canguru e ambulatório de seguimento. Objetivo: Determinar o perfil do recém-nascido, acompanhado na 3ª etapa do Método Canguru, desde a sua implantação, analisando aspectos do nascimento até a alta ambulatorial. Métodos: Estudo epidemiológico retrospectivo e transversal com dados obtidos dos prontuários dos recém-nascidos, atendidos no ambulatório da 3ª etapa do Método Canguru, de uma maternidade pública de nível terciário do município de Manaus, no período de setembro de 2012 a maio de 2014. Análise estatística realizada em programa EXCEL, versão 2013 e distribuídos em tabelas de frequência com percentuais e desvio padrão. Resultados: A amostra constituiu-se de 58 recém-nascidos (dentre 5162 nascidos no mesmo período), sendo 58,6% (34/58) do gênero feminino, com peso médio ao nascer de  $1912 \pm 372$  gramas e idade gestacional média de  $33,8 \pm 2,5$  semanas. Suas mães tinham em média  $22,5 \pm 5,6$  anos e, apesar de 86,21% (50/58) encontrarem-se na fase adulta (maiores de 18 anos), apenas 20,69% (12/58) realizaram pré-natal adequadamente (6 ou mais consultas). O tempo de internação hospitalar foi em média 20,4 dias e o peso de alta foi em média  $2063 \pm 244$  gramas. A frequência de aleitamento exclusivo no momento da alta foi de 91,3% (53/58) e o ganho ponderal, durante o seguimento ambulatorial, foi de 26,14 gramas por dia. Conclusão: Na amostra estudada houve um predomínio de prematuros tardios com baixo peso ao nascer, cujas mães são adultas jovens e procedentes de Manaus. Na alta hospitalar os bebês tinham em média peso acima do recomendado pelo Método Canguru com ganho ponderal adequado e uma alta frequência de aleitamento materno exclusivo que vem fortalecer a implantação do cuidado com o recém-nascido de alto risco.