



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL
de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Hérnia De Amyand

Autores: WELLINGTON LUIZ RODRIGUES MAGALHÃES (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); LUIZ OTÁVIO SOARES MAGALHÃES (UNIVERSIDADE IGUAÇU - CAMPUS V); ANALICE SOARES MAGALHÃES (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); ANDRE PANCRÁCIO ROSSI (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); ANA CAROLINA SOARES DE SÁ (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); MANUELA SOUZA SANTANA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); THAIS PEREIRA MOREIRA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); FERNANDA APARECIDA COSTA DE SOUZA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); ANDRESSA RANGEL DE OLIVEIRA LIMA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ); FERNANDA CARDILO LIMA (HOSPITAL SÃO JOSÉ DO AVAÍ)

Resumo: Introdução: A hérnia de Amyand é uma entidade considerada rara. É definida como uma hérnia inguinal onde o apêndice vermiforme está presente no saco herniário podendo ou não ser acompanhado por inflamação. Lactente do sexo masculino com 4 meses de idade apresentou distensão abdominal, parada de evacuação há cinco dias, vômitos e recusa alimentar associado a irritabilidade. Ao exame físico: Abdome globoso, peristalse presente, ausência de visceromegalias com dor á palpação difusa. Presença de tumefação inguinal à direita irradiando para bolsa escrotal de mesmo lado. Exames laboratoriais normais. Paciente foi submetido à inguinotomia seguida de apendicectomia através do conduto peritôneovaginal e Herniorrafia à Bassini. O achado cirúrgico foi compatível com apendicite exsudativa no saco escrotal. Encaminhado no pós-operatório para realizar antibioticoterapia sistêmica. A hérnia de Amyand imita uma hérnia inguinal encarcerada/estrangulada, portanto, tratada como uma emergência cirúrgica. Atrasos no diagnóstico podem resultar em complicações graves como peritonite, abscesso apendicular e fasceíte necrosante.