22º CONGRESSO BRASILEIRO DE
PERINATOLOGIA
IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL
de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título:

Autores: CECILIA SANTOS WALDMANN (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); ENDY MARTINS DE ARAUJO (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); MARIA ROSA SUSSEKIND VIVEIROS DE CASTRO (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); CASSIO LUIZ DE CARVALHO SERAO (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); CAMILLE ALBUQUERQUE TORRES (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); ANA FLAVIA PINTO GAIGHER (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); MARIO NOVAIS (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO); ANDREA ROSA (HOSPITAL DANIEL LIPP/UTI RIO)

Resumo: Introdução: Osteogênese imperfeita (OI) é uma síndrome genética do tecido conjuntivo, caracterizada por diminuição da massa óssea e fraturas recorrentes. É frequentemente associada com esclera azul, anormalidades dentárias, perda progressiva da audição e história familiar positiva. Geralmente ocorre por mutações nos genes COL1A1 ou COL1A2 que codificam o colágeno tipo 1, principal proteína da matriz extracelular dos ossos. A maioria dos casos são herdados de maneira autossômica dominante e mutações novas são frequentes. A OI pode ser classificada em grupos de I a IX. O diagnóstico é eminentemente clínico-radiológico e a classificação da doença continua sendo desafiadora. O prognóstico varia muito entre doentes, depende do tipo de OI, da severidade da doença e dos tratamentos disponíveis. Objetivos: Relatar dois casos de osteogênese imperfeita no período neonatal. Métodos: Análise do prontuário médico, evolução diária na UTI neonatal, exames complementares e revisão de literatura. Resultados: Relatamos o caso de dois pacientes com diagnóstico de OI. O primeiro paciente é um recém-nascido prematuro (28 semanas) do sexo masculino, apresentava no exame físico macrocefalia, proptose ocular discreta, esclera azulada, nariz pequeno, fície triangular e pectus excavatum discreto. Evoluiu com fraturas bilaterais de fêmur e omero e hidrocefalia. O segundo paciente, sexo feminino, a termo, apresentava ao nascimento fratura consolidada em fêmur direito, evoluiu com fraturas bilaterais em omero e fratura em bula esquerda. Pela classificação de Sillence o primeiro caso foi diagnosticado como OI tipo III e o segundo como OI tipo II. Conclusão: A OI não tem cura, mas a expectativa e a qualidade de vida dos pacientes podem ser melhoradas através de um tratamento multidisciplinar. Os tratamentos atuais visam prevenir e tratar fraturas, corrigir deformidades decorrentes da posição, aumentar a densidade óssea e minimizar a dor. Os bifosfonados tem sido utilizados com bons resultados a curto prazo, no que diz respeito ao aumento da densidade óssea. As malformações congênitas como a OI, são uma grande causa de mortalidade infantil, sendo imprescindível o melhor entendimento das mesmas pois o diagnóstico precoce associado ao tratamento adequado melhora muito seu prognóstico.