



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Um Estudo De Caso De Cisto De Cordão Espermático

Autores: RENATA BARBOSA NOGUEIRA GIBRAM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO); VITOR ANTONACCI CONDESSA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO); JANAINA JUBE UHLEIN (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO); FÁTIMA LÚCIA GUEDES SILVA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO)

Resumo: O cisto de cordão espermático é um acometimento raro em recém-nascidos, mas de grande relevância na clínica pediátrica, sendo um dos diagnósticos diferenciais da hérnia inguinal. Os objetivos são: apresentar um caso clínico de um lactente de 60 dias com cisto no funículo espermático direito e apresentar uma revisão atualizada sobre o tema. Para isso, utilizou-se de um estudo exploratório por meio de pesquisa bibliográfica nas plataformas eletrônicas PubMed e Scielo. Paciente foi internado com abaulamento irreduzível, na região inguinal e suspeita diagnóstica de hérnia inguinal direita. Paciente estava com bom estado geral, ativo e vigil, alimentando de leite materno exclusivo, sem náuseas. O exame físico do abdome revelou um abdome plano, com presença de ruídos hidroaéreos e presença de tumefação inguinal direita móvel, dolorosa, de contornos lisos, sem sinais flogísticos. O exame do aparelho geniturinário apresentou testículos eutópicos. Foi solicitado ultrassonografia de parede abdominal com urgência. Os resultados da ultrassonografia, feita com transdutor linear de 7,5 e 12,0 Mhz, foram: ausência de hérnia inguinal bilateralmente; linfonodos de aspecto reacional na região inguinal, de aspecto benigno; sem indícios de lesão muscular regional; e cistos simples e confluentes de funículo espermático direito, com formação ovalada, de paredes finas e regulares, com conteúdo anecóico, abaulando focalmente o canal inguinal homolateral. Durante a internação, foi administrado dipirona e feito analgesia não farmacológica. A internação foi de um período de uma dia e o paciente se manteve com bom estado geral, ativo e hidratado. O diagnóstico foi presença de linfonodo reacional na região inguinal direita e de cisto de funículo espermático direito. Então, o paciente foi encaminhado para a cirurgia pediátrica. De acordo com a literatura pesquisada, o cisto de cordão espermático é um tipo mais raro de hidrocele em que há o fechamento do processo vaginal acima do testículo e abaixo do anel inguinal interno e aparece na ultrassonografia como uma coleção fluida ao longo do cordão. A sintomatologia é semelhante ao da hérnia inguinal, sendo assim um diagnóstico diferencial dessa patologia. A detecção é feita a partir da ultrassonografia de região inguinal e, assim como a hérnia inguinal, o tratamento é cirúrgico.