



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Síndrome De Bartter No Período Neonatal

Autores: JOSIELSON SILVA (UFBA - UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA); DENER GERUSO COSTA MASCARENHAS (UNIJORGE); SAMIRA VIEIRA CEZAR MATOS (UFBA); LOUISE LISBOA DE OLIVEIRA VILLA (UFBA)

Resumo: A síndrome de Bartter consiste numa tubulopatia pouco frequente que pode manifestar-se com fenótipos variados. Facilmente confundida com doenças mais comuns, tornando evidente a dificuldade do diagnóstico. Tal patologia foi descrita inicialmente em 1962 por Frederic Bartter, endocrinologista estadunidense que caracterizou a patologia como uma alteração clínica do recém-nascido evidenciada por alcalose metabólica hipocalêmica, hiperreninêmica, com pressão arterial normal. Clinicamente, a maioria dos pacientes são desnutridos com acentuado retardo do crescimento. Este estudo tem como objetivo discutir as manifestações clínicas da Síndrome de Bartter no período neonatal uma vez que o estabelecimento de um diagnóstico precoce melhora o prognóstico dos recém-nascidos acometidos, em relação ao crescimento, ao desenvolvimento e à qualidade de vida. Trata-se de um estudo explorativo de caráter qualitativo do tipo revisão sistemática. Utilizou-se artigos publicados em base de dados indexáveis como: LILAC[®] e SCIELO. Foram encontrados 06 artigos, dos quais utilizou apenas 3. Como critério de inclusão adotamos textos disponíveis na íntegra publicados nos últimos 05 anos apresentados em língua portuguesa. Foram excluídos os artigos que não tinham relação com os objetivos de estudos. A discussão se deu partindo da correlação entre as ideias discutidas pelos autores seguindo uma ordem cronológica. Pelo fato de ser uma doença rara, existem poucos relatos na literatura acerca de dados dificultando o diagnóstico para que se obtenha um tratamento rápido e eficaz. Notou-se pelos casos estudados que após a introdução da terapêutica específica observa-se a melhora do perfil metabólico e dos dados nutricionais, com recuperação do déficit de peso na maioria dos pacientes. Como desafio foi gratificante para a nossa equipe a conclusão deste estudo, que a postura de alerta para o diagnóstico e para a introdução de medidas terapêuticas adequadas e precocemente, resulta na satisfação da melhora do quadro clínico do paciente.