



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico De Prematuros Extremos Internados Em Uma Uti Neonatal

Autores: MATHEUS BONFIM DOMINGOS (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); FLÁVIA COSTA SOARES (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); MÍRIAN FAGUNDES DOS SANTOS (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); NATHALIA ALFAIX MARTINS PALHEIRO VICENTE (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); DANIELA HENRIQUES SOARES LOPES DEBS (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); YURI DINIZ DEBS (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); MARCUS MESQUITA RODRIGUES LIMA (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI); SAMUEL RIBEIRO DIAS (FUNDAÇÃO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE ARAGUARI)

Resumo: A prematuridade extrema representa situação de maior risco para complicações imediatas assim como para sequelas futuras. O objetivo do presente estudo foi conhecer o perfil das internações de prematuros extremos na única unidade de terapia intensiva (UTI) neonatal de uma cidade do interior de Minas Gerais. Para tanto os autores realizaram estudo retrospectivo, transversal e analítico com dados secundários obtidos de livro de registro de alta no período de 2007 a 2014. Dos 677 registros de alta, 34 eram prematuros extremos. A média de idade das mães foi de 23,4 anos. O número de partos anteriores, o número de gestações e de abortos não foi diferente quando comparados aqueles com idade gestacional maior do que 30 semanas. O apgar de primeiro minuto menor do que 7 ocorreu em 42,9% ($p < 0,001$) destes prematuros. taquipnéia transitória, o desconforto adaptativo, a membrana hialina e a displasia broncopulmonar foram significativamente mais frequentes neste grupo ($p < 0,001$). A hipoglicemia ocorreu na mesma frequência que nas demais idades gestacionais ($p > 0,05$). Apesar da baixa frequência de registros de prematuros extremos em comparação ao registro das demais idades gestacionais contidos no livro de alta desta unidade de terapia intensiva neonatal, este grupo manteve uma maior incidência de intercorrências clínicas desfavoráveis pesando na incidência dessas na unidade.