



22º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

IX SIMPÓSIO INTERNACIONAL de Medicina Fetal da SGOB

CENTRO DE CONVENÇÕES
ULISSES GUIMARÃES . BRASÍLIA . DF
19 A 22 DE NOVEMBRO DE 2014

Trabalhos Científicos

Título: Hepatite Causada Por Desnutrição Protéico-calórica

Autores: FRANCIELE SCOBAR GOMES (HRMS); LEONARDO RODRIGUES RESENDE (HRMS)

Resumo: Introdução: A desnutrição proteico-calórica é uma das principais causas de mortalidade e morbidade em crianças podendo evoluir com várias complicações, entre elas a deterioração das enzimas hepáticas. Apesar da sua importância existem poucos relatos na Literatura. Objetivo: Expor um caso de desnutrição em lactente que evoluiu com hepatite. Métodos: Estudo descritivo tipo relato de caso. Descrição: Lactente nascido de 37 semanas e 6 dias, apgar 9 e 10, peso nascimento=2575 g, triagem neonatal sem alterações, recebeu alta em 48 horas com leite materno livre demanda e complemento via oral. Com 1 mês e 11 dias de vida evoluiu com perda de peso ponderal (peso atual= 2410g), desnutrição protéico-calórica e deterioração das funções hepáticas com aumento de aminotransferases no soro (TGO= 1900 e TGP= 1180). Durante internação foi realizado pesquisa para Erro Inato do Metabolismo, negativa até o momento, USG de rins e vias urinárias que evidenciou bile tumefacta e rins de dimensões reduzidas, demais exames sem alterações. Avaliada pela fonoaudióloga que evidenciou sucção presente, porém não nutritiva. Foi então realizada orientação materna quanto ao aleitamento, correção da pega e estímulos. Com 10 dias de evolução já apresentava enzimas hepáticas dentro da normalidade (TGO= 33 e TGP= 73) e ganho de peso de 60 gramas por dia. Recebeu alta mantendo acompanhamento ambulatorial. Conclusão: Foi notado que a desnutrição proteico-calórica afeta as funções metabólicas do fígado levando a deterioração das funções hepáticas com aumento de aminotransferases no soro. A função hepática foi avaliada por meio das dosagens bioquímicas do soro.