



08 A 11 DE
NOVEMBRO

Vissoft Experience
Rua Professor Pedro Viriato Parigot de Souza,
5300 - Cidade Industrial de Curitiba, Curitiba - PR



Trabalhos Científicos

Título: Doença Da Arranhadura Do Gato: Manifestações Clínicas E Oftalmológicas Em Um Paciente Em Hospital Pediátrico De Alta Complexidade Em São Paulo: Relato De Caso.

Autores: JULIA SAAD DE SOUZA (HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS), RAFAELA CENTURION SANCHES (HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS), HELMAR ABREU ROCHA VERLANGIERI (HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS), MARCELO OTSUKA (HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS), ELIANE FRANCO DE LACERDA COSTA E SILVA (HOSPITAL INFANTIL DARCY VARGAS)

Resumo: A Doença da Arranhadura do Gato (DAG) é uma zoonose de distribuição mundial, que acomete crianças e adolescentes, com achados em adultos, associada a diferentes manifestações clínicas. É usualmente benigna, autolimitada, causada por uma bactéria gram-negativa, denominada *Bartonella henselae*, agente primário de DAG e a espécie mais frequentemente associada a manifestações em humanos. Na maior parte dos casos a doença caracteriza-se por linfadenite regional que se segue à inoculação da bactéria através da arranhadura, mordidas ou feridas na pele, boca, olhos, principalmente pelos gatos jovens. O espectro clínico é amplo, desde linfadenopatia regional até comprometimento sistêmico. Em 5-25% dos pacientes imunocompetentes pode ocorrer manifestações atípicas da doença com comprometimento sistêmico. Paciente de 10 anos de idade, previamente hígido, proveniente de Taboão da Serra/SP, referia arranhadura em nariz por gato de estimação de seis meses de idade. Evoluiu com nodulação em região cervical direita de aumento progressivo há dois meses, associado à perda de peso, sudorese noturna e febre recorrente. Fez uso de Amoxicilina com Clavulanato e Ceftriaxona em outro serviço, sem melhora do quadro. Na internação realizado TC cervical, apontando coleção em região cervical lateral à direita e USG de abdome com esplenomegalia e pequenos linfonodos mesentéricos. Apresentou alterações visuais e na avaliação oftalmológica presença de neurite e edema de mácula em olho esquerdo, característica de DAG. Iniciado tratamento com Doxiciclina e Corticoide. Realizada sorologia para *Bartonella henselae* que demonstrou títulos dos anticorpos superiores aos valores de referência confirmando o diagnóstico. Após drenagem do linfonodo supurado e do tratamento instituído paciente teve alta hospitalar para seguimento ambulatorial. A Doença da Arranhadura do Gato tem uma evolução benigna na maioria dos casos, sendo a manifestação clínica predominante da infecção um distúrbio cutâneo localizado e linfadenopatia regional. É um diagnóstico diferencial de grande relevância nos casos de adenomegalia. As manifestações oculares ocorrem em 3-15% dos pacientes com DAG. Este relato destaca a importância do diagnóstico e tratamento precoces da DAG em crianças com o objetivo de reduzir a possibilidade de complicações graves. Enfatizamos a necessidade de considerar essa doença no diagnóstico diferencial de adenomegalias em crianças. O tratamento seguindo as diretrizes recomendadas é essencial para minimizar complicações associadas a essa doença.