



23º CONGRESSO
BRASILEIRO DE
INFECTOLOGIA
PEDIÁTRICA
18º SIMPÓSIO
BRASILEIRO DE
VACINAS
30 DE ABRIL A 3 DE MAIO DE 2015 São Paulo - SP

30 DE ABRIL
A 3 DE MAIO

Novotel São Paulo Center Norte
Av. Zaki Narchi, 500 - Vila Guilherme, São Paulo



Trabalhos Científicos

Título: Perfil Dos Recém-Nascidos Expostos À Toxoplasmose Gestacional No Sul Do Brasil Entre 2015 E 2025

Autores: DAVI RODRIGUES MARTINS (UFRGS), SIZUANE RIEGER HOLLER (UFRGS), CAROLINE DOS PASSOS (UFRGS), ESTEFANY ALVES SILVESTRE (UFRGS), MARIA THAWANNA ZORTEA ANTUNES (UFRGS), ANA CLARA MACHADO TEIXEIRA (UFRGS), CLARISSA GUTIERREZ CARVALHO (UFRGS HCPA)

Resumo: A toxoplasmose afeta aproximadamente um terço da população mundial. Quando ocorre durante a gestação, pode ser transmitida ao feto pela via hematogênica transplacentária, resultando em riscos significativos de sequelas como graves alterações visuais, deficiência auditiva e alterações neurológicas. Apesar da alta soroprevalência no Brasil, poucos estudos abordam a incidência de toxoplasmose congênita sintomática, prejudicando a identificação de fatores de risco, a implementação de medidas preventivas e o manejo dos pacientes."Este estudo visa identificar a incidência de exposição à toxoplasmose gestacional entre os nascidos vivos no centro obstétrico de hospital terciário universitário e descrever os fatores associados à exposição e ao desenvolvimento da toxoplasmose congênita no período descrito."Foi realizado um estudo de coorte observacional retrospectivo com dados dos nascidos expostos à toxoplasmose gestacional e encaminhados ao ambulatório de Expostos à Toxoplasmose Gestacional do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os dados foram coletados dos prontuários médicos, armazenados em banco de dados no Excel e analisados com SPSS versão 18.0. Utilizou-se o teste de qui-quadrado para variáveis categóricas e teste t de Student para variáveis contínuas, com significância estatística definida para $p < 0,05$. "Entre 222 crianças expostas, 18 desenvolveram toxoplasmose congênita, com uma prevalência de 8,1%. A idade materna média foi de 26,6 anos, e 35% tinham ensino médio completo. A soroconversão no terceiro trimestre foi maior no grupo com infecção confirmada (66,8% vs 29,5%, $p=0,003$). O tratamento foi iniciado em 61% das gestantes. A idade gestacional média foi menor nos infectados ($37 \pm 2,4$ vs $38,5 \pm 1,6$, $p=0,001$). O tratamento triplice foi adotado para todos os casos confirmados de toxoplasmose congênita."A prevalência de toxoplasmose congênita foi elevada nesse grupo e demonstrou-se que a soroconversão no final da gestação é um fator relevante, assim como desfecho gestacional mais precoce.