



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados Ao Nascimento De Crianças, A Termo, Adequadas E Pequenas Para A Idade Gestacional

Autores: MARIANA DE LIMA COSTA (UFBA); THIAGO L ALVES (UFBA); ANA CECÍLIA T SANTIAGO (UFBA); SANDRA S VALOIS (UFBA); HUGO DA COSTA RIBEIRO JUNIOR (UFBA)

Resumo: Introdução: Por apresentarem dificuldade de adaptação neonatal, alto risco de morbidade e de mortalidade, torna-se necessária a identificação dos possíveis determinantes para o nascimento de pequenos para a idade gestacional possibilitando a prevenção de desfechos desfavoráveis. Objetivo: identificar os fatores associados ao nascimento de lactentes, a termo, e adequados e pequenos para a idade gestacional. Métodos: estudo transversal, derivado de um longitudinal prospectivo, com amostra não probabilística, no qual foram incluídos recém-nascidos a termo adequados e pequenos para a idade gestacional de maternidades públicas. No decorrer do primeiro mês de vida desses lactentes foram coletadas, através de entrevista, informações referentes aos antecedentes clínicos e obstétricos das genitoras e socioeconômicos e antropométricos dos genitores na primeira consulta. Foram utilizadas frequências absoluta e relativa e a aplicados ANOVA, para analisar a distribuição das variáveis, e os Testes qui-quadrado de Pearson ou Exato de Fisher e Teste t. Resultados: 30 (54,55%) lactentes foram classificados como adequados e 25 (45,45%) como pequenos para a idade gestacional. Peso ao final da gestação foi menor entre as genitoras dos nascidos pequenos para a idade gestacional ($p=0,03$). Uso de tabaco ($p=0,03$) e ocorrência de hipertensão arterial ($p=0,00$) e parasitose ($p=0,01$) foram mais frequentes entre as gestantes dos nascidos pequenos para a idade gestacional. Conclusão: o baixo número de genitoras envolvidas neste estudo permitiu encontrar diferença entre os grupos, sendo mais frequentes entre as genitoras dos nascidos pequenos para a idade gestacional o peso ao final da gestação, a ocorrência de hipertensão arterial e parasitose e o uso de tabaco no período gestacional.