



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Associação Entre Tipo De Aleitamento E Desenvolvimento Motor Grosseiro De Lactentes No Sexto E Décimo Segundo Mês De Vida

**Autores:** ANELISA LEITE (UNICAMP)

**Resumo:** Introdução: Para um desenvolvimento infantil adequado, o leite materno exclusivo é recomendado pela Organização Mundial da Saúde até os 6 meses de idade. Objetivo: avaliar o desenvolvimento motor em crianças com 6 e 12 meses segundo o tipo de aleitamento. Método: estudo transversal para a análise aos seis e longitudinal aos doze meses de idade. 82 crianças nascidas a termo, foram avaliadas em seu desenvolvimento motor utilizando-se a Alberta Infant Motor Scale, segundo o tipo de aleitamento: exclusivo/predominantemente exclusivo (AME/PE) ou misto/artificial (AM/AA). A análise estatística foi realizada considerando-se todas as variáveis independentes da mãe e do recém-nascido (RN) segundo a resposta dos escores da escala: normal, suspeita e com atraso. Para as variáveis contínuas foi utilizado médias, desvios padrão, medianas e percentis 25 e 75 com testes t de Student ou Mann-Whitney. Todas as variáveis foram analisadas através de regressão logística aos 6 e 12 meses com risco relativo e intervalo de confiança de 95%.  $p < 0.05$ . Resultados: tivemos aos 6 meses 42 com AME/PE e 40 com AM/AA. Em relação ao desempenho motor foram encontradas 70 no grupo normal e 12 no grupo suspeito. Não houve nenhuma criança classificada com atraso. Nesta análise nenhuma variável estudada foi significativa para a avaliação motora considerando a análise bivariada e a múltipla. Aos 12 meses obtivemos 57 no grupo normal, 12 no suspeito e 13 com atraso. Ao final da análise múltipla permaneceram como variáveis independentes associadas à escala com atraso, a estatura do recém-nascido, o parto cesariano e o fato de não ser realizada a estimulação grosseira na criança. Conclusão: não houve associação estatisticamente significativa entre o desenvolvimento motor em crianças com 6 meses e o tipo de aleitamento, bem como para outras variáveis de controle. Aos 12 meses as variáveis que permaneceram associadas à alteração motora foram a estatura do RN, o parto cesariano e o fato de não ser realizada a estimulação grosseira na criança.