



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Caracterização Das Notificações De Perda De Acessos Venosos Em Uma Unidade De Neonatologia Em Um Hospital De Atenção Terciária

**Autores:** JESSAMINE FÉLIX DE FARIAS (HOSPITAL REGIONAL NORTE); JOSÉLIA MARIA LOPES DOS PRAZERES (HOSPITAL REGIONAL NORTE); JOÃO KILDERY SILVEIRA TEÓFILO (HOSPITAL REGIONAL NORTE); JULIANA MENDES GOMES (HOSPITAL REGIONAL NORTE); FRANCISCO JOSÉ DE LUNAS JÚNIOR (ESCOLA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ANTÔNIO TARCÍSIO ARAGÃO)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: O acesso venoso central no recém-nascido internado constitui um mecanismo de auxílio no tratamento desse paciente, exigindo da equipe de saúde conhecimento técnico e cuidados adequados para sua manutenção. OBJETIVO: Identificar as notificações sobre perda de acesso venoso central, em um setor de neonatologia. MÉTODOS: Estudo de abordagem quantitativa e documental realizada em abril de 2016, através da coleta no banco de dados das notificações de eventos sentinela de 2015 do Núcleo de Gestão e Segurança do Paciente de um hospital público regional do Estado do Ceará. O Serviço de neonatologia é composto por 45 leitos de cuidados intensivos e intermediários. RESULTADOS: Foram registrados, em 2015, 74 eventos relacionados à perda de cateteres venosos, perfazendo uma média de 6,2 eventos/mês. Em relação as vias acometidas tivemos: umbilical (71%), subclávia (11,4%), jugular (10%), outros(7,6%). Quanto às causas da retirada não planejada identificou-se que 19,5 % ocorreram por fixação inadequada do acesso, 18,2% por agitação do paciente, 11,7% por ruptura de pontos, 10% por problemas relacionados ao cateter, 27,3% foram por causas inexplicáveis, outros 13,3% (mudança de decúbito, realização de procedimentos, mau posicionamento do paciente e mudança de leito). O turno noturno foi o período que mais foram notificadas perdas de acesso compreendendo 45% dos eventos notificados. CONCLUSÃO: A via umbilical foi a de maior relevância nas notificações em virtude de ser uma opção fácil e de rápido acesso em neonatologia. Várias causas justificaram a perda de acesso, o que evidencia a necessidade de conhecimento e familiarização dos profissionais desse setor sobre as várias técnicas e cuidados necessários para a manutenção desse procedimento. Portanto, a capacitação da equipe e a continua notificação dos casos tornam-se importantes ferramentas no cuidados ao recém-nascido hospitalizado.