



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Epidemiológico De Mães Hiv Positivo E De Seus Recém-Nascidos

Autores: FABIANI WAECHTER RENNER (UNISC); ANGÉLICA FEIL (UNISC); NÁGILA SIMON ZIEBELL (UNISC)

Resumo: INTRODUÇÃO: A transmissão vertical do HIV tem se tornado um desafio na saúde pública. O diagnóstico precoce do HIV na gestação é de fundamental importância para a profilaxia e manejo adequado durante o trabalho de parto. OBJETIVO: Determinar o perfil epidemiológico de gestantes HIV positivas e de seus neonatos em um Hospital de Referência no interior do Rio Grande do Sul. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo exploratório descritivo com abordagem quantitativa retrospectiva. Para o levantamento de dados, verificaram-se os prontuários de gestantes HIV positivas e de seus neonatos no período de 2012-2013. RESULTADOS: A faixa etária materna variou de 15 a 44 anos, com média de 29 anos. A profissão mais frequente foi “do lar”, sendo que 70% das pacientes tinham ensino fundamental incompleto e 75% eram solteiras. Quanto à paridade, a média foi de três gestações. O pré-natal variou de 1-14 consultas, com média de oito. A idade gestacional média foi de 38,5 semanas e a via de parto foi 100% cesárea. Quanto aos neonatos, a média de peso ao nascer foi de 2965g, o comprimento médio foi 47,3cm e o APGAR no quinto minuto foi nove. A totalidade dos recém-nascidos recebeu quimioprofilaxia adequada nas primeiras horas de vida e fez-se uso exclusivo de fórmula infantil. Todos recém-nascidos receberam vacina contra hepatite B e usaram Fitomenadiona antes de receberem alta hospitalar. A alta hospitalar ocorreu em dois dias para 70% dos neonatos. CONCLUSÃO: O serviço de referência está qualificado, visto que não foram observadas alterações clínicas consideráveis com as pacientes soropositivas e com seus neonatos. Além disso, a totalidade dos recém-nascidos recebeu quimioprofilaxia adequada em tempo hábil, consistindo em cuidados criteriosos durante e após o nascimento.