



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Relato De Caso: Hemangiomatose Neonatal Benigna

**Autores:** CARLA ELISA COLLA BOGDANOVICZ (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL); ADRIANA PRAZERES DA SILVA (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL); KALLYNA BARBOSA RACOSKI (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL); TAÍSA MACHADO RODRIGUES DA CUNHA (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL); FRANCIELE SCOBAR GOMES (HOSPITAL REGIONAL DE MATO GROSSO DO SUL)

**Resumo:** Introdução: hemangiomas são tumores do endotélio vascular, se aparecem no período neonatal com múltiplas lesões é considerada hemangiomatose neonatal. Há apenas lesões cutâneas na hemangiomatose neonatal benigna (HNB), já na hemangiomatose neonatal difusa (HND) há comprometimento extracutâneo. Descrição do caso: J.V.R., sexo feminino, nasceu com 27 semanas de idade gestacional de parto cesáreo, pesando 995 gramas. Mãe com 30 anos, múltipara, apresentou doença hipertensiva e diabetes na gestação. Admitida devido à enterocolite, com necessidade de intervenção cirúrgica. Com 34 dias de vida apresentou lesões eritematosas disseminadas, foi avaliada por especialista que constatou 2 pápulas eritematosas em ombro direito e 3 pápulas puntiformes em pálpebra esquerda, região malar direita e joelho esquerdo, sendo aventada hipótese diagnóstica de HNB. Houve aumento progressivo das lesões, o que confirmou o diagnóstico. Realizado exames de imagem para descartar HND, com resultados normais. Com 60 dias de vida apresentou sangramento na lesão em região cervical, iniciado propranolol com melhora. Durante a internação apresentou complicações e com 4 meses evoluiu a óbito. Comentários: a etiologia do hemangioma é multicausal com fatores genéticos e perinatais. Um estudo demonstrou estarem associados ao surgimento de hemangioma os fatores: sexo feminino, gravidez não planejada, tabagismo materno, história de consumo de álcool durante a gravidez. Gestações múltiplas, baixo peso ao nascer e tipo de fertilização estão associados à gravidade do hemangioma. No caso relatado a paciente era do sexo feminino, baixo peso ao nascer e a sétima filha. O diagnóstico do hemangioma é clínico, a ultrassonografia pode ser utilizada nos casos de incerteza do diagnóstico ou hemangiomas profundos. No caso descrito, o diagnóstico foi clínico, sendo realizados exames de imagem para investigar lesões extracutâneas. Os hemangiomas infantis tendem a regredir e até desaparecer espontaneamente ao longo do tempo, sem necessidade de tratamento. No caso descrito, foi realizado tratamento devido ao sangramento.