



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Hemangioma Congênito Rapidamente Involutivo (Rich): Um Relato De Caso

Autores: MARYANE CRISTINE SAFRAIDER (HOSPITAL DE CLÍNICAS/UFPR); TYANE ALMEIDA PINTO (HOSPITAL DE CLÍNICAS/UFPR); VÂNIA OLIVEIRA DE CARVALHO (HOSPITAL DE CLÍNICAS/UFPR); REGINA VIEIRA CAVALCANTE (HOSPITAL DE CLÍNICAS/UFPR)

Resumo: INTRODUÇÃO: Hemangiomas congênitos rapidamente involutivos (RICH) são caracterizados por placas ou tumores localizados na cabeça, pescoço ou membros. São lesões vasculares raras, estão presentes desde o nascimento e tendem à involução entre 6 e 14 meses de vida. DESCRIÇÃO DO CASO: paciente feminina, nascida a termo (39+3 semanas), peso ao nascer 3005g, AIG, sem complicações ao nascimento. Foi encaminhada ao Serviço de Dermatopediatria de um hospital universitário terciário com a hipótese diagnóstica de hemangioma da infância. Apresentou desde o nascimento tumoração na região anterior de coxa esquerda, com redução espontânea de volume e cor da lesão a partir dos 15 dias de vida. Em atendimento no serviço de referência aos 30 dias de vida, foi observada tumoração de coloração azulada com múltiplas telangiectasias superficiais, acometendo região distal de coxa esquerda. Não havia outras queixas ou alterações ao exame físico. Diante da história evolutiva e do exame clínico, aventou-se a hipótese de RICH e assegurou-se o acompanhamento clínico da paciente. Em consultas subsequentes, manteve-se o padrão de diminuição do tamanho da lesão, com redução de 3 cm no período de 2 meses de acompanhamento clínico, restando mancha hipocrômica com poucas telangiectasias centrais, o que confirmou o diagnóstico de RICH. COMENTÁRIOS: OS RICH são lesões vasculares incomuns, cujo reconhecimento pelo neonatologista e pelo pediatra que assiste aos recém-nascidos no Alojamento Conjunto faz-se essencial. Por sua involução espontânea, não necessitam de tratamento, ao contrário do hemangioma da infância, que deve ser tratado em algumas circunstâncias. Desta forma, o exame físico minucioso após o nascimento é fundamental para que lesões como o RICH sejam devidamente diagnosticadas, observadas, descritas e acompanhadas.