



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Sífilis Congênita: Um Relato De Caso

**Autores:** TYANE DE ALMEIDA PINTO (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA(PR)); POLLYANA MOREIRA SCHNEIDER (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA (PR)); ANA LÚCIA SARQUIS (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA (PR)); DANIELA CARREIRO DE ALMEIDA SCHMIDTKE (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA (PR)); CINTIA LOPES (UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ - CURITIBA (PR))

**Resumo:** **INTRODUÇÃO:** A sífilis congênita é causada pela transmissão vertical do *Treponema pallidum*. Para o tratamento da criança infectada, a única droga comprovadamente eficaz não tem estado regularmente disponível nos diversos setores de saúde do Brasil há pouco mais de um ano. **DESCRIÇÃO:** Em março de 2016, um recém-nascido (RN) foi diagnosticado com sífilis congênita precoce sintomática. Mãe de 34 anos, sífilis inadequadamente tratada na gestação, pré-natal irregular. A paciente foi admitida em trabalho de parto, evoluindo para parto vaginal. Apresentou testes rápidos para VDRL positivo e HIV negativo. RN prematuro tardio de 36 semanas, feminino, nascido em bom estado geral, banhado em mecônio fétido, APGAR 7/9, peso de 2410 gramas (pequeno para a idade gestacional) e foi transferido à UTI neonatal. Ao exame físico, apresentava lesões cutâneas (pênfigo sífilítico) em extremidades, hepatoesplenomegalia e icterícia. À radiografia de ossos longos, faixas hipodensas em metáfises. Exames coletados após 12 horas de vida evidenciaram VDRL de 1:128, plaquetas de 8000/mm<sup>3</sup>, alteração de exames hepáticos com destaque para bilirrubina direta aumentada. Realizou 7 dias de tratamento com gentamicina por sepsse neonatal precoce e cefotaxima durante 14 dias para tratamento da sífilis (indisponibilidade de penicilina cristalina). Coletado liquor, o qual resultou normal, somente no 12º dia de tratamento devido a plaquetopenia. Alta com 18 dias de vida, pesando 2335 gramas, com boa aceitação de dieta via oral e acompanhamentos devidos para áreas como infectologia e gastroenterologia pediátricas. **COMENTÁRIO:** Apesar da sífilis ter tratamento eficaz e simples, as condições sociais precárias e a falta de penicilina benzatina e cristalina na maioria dos serviços de saúde fazem com que casos novos de sífilis congênita ainda existam na população e que estes sejam tratados inadequadamente, aumentando a chance da sífilis congênita reaparecer entre as doenças comuns do RN.