



23^o CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Perfil Clínico E Obstétrico Dos Nascidos Vivos De Picos

Autores: ARTEMIZIA FRANCISCA DE SOUSA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ); FERNANDA VITÓRIA DE OLIVEIRA SOUSA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); CAMILA DA COSTA SOARES (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); INGRED PEREIRA CIRILO (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); LEYLLA LAYS ALVES E SILVA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); MARCELA DE SOUSA SANTOS (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); MARIANA TEIXEIRA DA SILVA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); RAYLA TUANE SOARES BARBOSA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); EDINA ARAÚJO RODRIGUES OLIVEIRA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.); LUISA HELENA DE OLIVEIRA LIMA (UFPI, CSHNB, PICOS, PIAUÍ.)

Resumo: INTRODUÇÃO: Com o advento da modernização o modelo de atenção medicalicista tem sido soberano na atenção obstétrica brasileira, caracterizado pelas crescentes taxas de cesarianas que aumentam a prevalência de nascimentos pré-termo. OBJETIVO: Traçar o perfil clínico e obstétrico dos nascidos vivos de um município do centro-sul piauiense. METODOLOGIA: Trata-se de estudo de natureza descritiva do tipo transversal, desenvolvido em hospital público de referência, realizado com 530 recém-nascidos no período de janeiro a dezembro de 2015. Para a coleta dos dados foi utilizado formulários adaptados e elaborados a partir de outros estudos. Na realização do estudo foram seguidos todos os princípios éticos contidos na Resolução 466/12, segue aprovado com o parecer número do Parecer: 372.190. RESULTADOS: O perfil obstétrico mostrou que 97,2% das puérperas realizaram pré-natal durante a gravidez, sendo que 76,3% realizaram entre 6 e 10 consultas, 68% realizou parto cesáreo, 80% não apresentou patologias durante a gravidez. Dentre as 19% que apresentaram, destaca-se a hemorragia como patologia mais frequente (3%). O sexo predominante dos recém-nascidos foi o masculino com 51,1%. Em relação ao peso ao nascer, o peso adequado foi soberano com 69,2%, mas o peso insuficiente foi significativo representando 21,5%. O comprimento e perímetro cefálico também apresentaram resultados apropriados 92,6% e 96,7%, respectivamente. Ainda assim o perímetro cefálico baixo teve um número considerável de 17 casos (3,3%). Sobre o escore de Apgar no 1º e 5º minuto foram 50,2% com pontuação 9 e 54% com pontuação 10. O tipo de parto predominante foi a cesariana (68,0%). CONCLUSÃO: Diante dos resultados obtidos, pode-se verificar a relevância da assistência pré-natal e de enfermagem mais eficazes que propiciem a mulher uma reprodução saudável e um bom desenvolvimento fetal.