



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Cesárea Eletiva Versus Morbidades Dos Recém-Nascidos Pretermo Tardio E Termo Precoce

**Autores:** LÚCIA CRISTINA DIAS DA SILVA (UNIMED CARUARU); DANIELLE MARTINS (UNIMED CARUARU); VALDIRENE DA CONCEIÇÃO (UNIMED CARUARU); FABIANA CRISTINA ROCHA (UNIMED CARUARU); DANIELLE CINTRA BEZERRA BRANDÃO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO)

**Resumo:** Introdução: A preocupação com as possíveis morbidades neonatais na realização de cesarianas eletivas, antes de 39 semanas, tem sido mundial. Objetivo: avaliar as morbidades dos recém-nascidos pretermo tardio (RNPT-tardio) e termo precoce nascidos de cesárea eletiva. Método: estudo descritivo, prospectivo, realizado no período de março a maio de 2016 em uma maternidade privada do interior do Estado de Pernambuco. Foram incluídos todos recém-nascidos (RN) entre 34 e 38 semanas completas e excluídos os neonatos com malformações. Variáveis maternas e neonatais foram analisadas, assim como a via de parto, indicação do parto cirúrgico, morbidades neonatais e tempo de permanência hospitalar. Resultados: Neste período, 385 partos ocorreram na maternidade e, destes, 208 foram nascimentos de RN entre 34 e 38 semanas de idade gestacional. A cesárea ocorreu em 201 gestantes (96,6%). O parto cirúrgico eletivo foi realizado em 114 pacientes (56%), sendo 11 nascimentos de RNPT-tardio e 103 RN termo precoce. Das gestantes de parto cesárea eletiva, 57 eram primíparas. Quanto aos 114 RN, a mediana do peso de nascimento e da idade gestacional foram, respectivamente, 3200 g (mínimo 2030 e máximo 4310g) e 38 semanas (mínimo 35 e máximo 38). O apgar do primeiro minuto foi 9 (mínimo 6 e máximo 10) e do quinto 10 (mínimo 8 e máximo 10). A mediana da permanência hospitalar foi de 36 horas (mínimo 24 e máximo 264h). Destes 114 RN, 6 neonatos foram admitidos na unidade de terapia intensiva (UTI) para tratamento de desconforto respiratório, 2 necessitaram de ventilação mecânica assistida, 4 de ventilação não invasiva e 1RN foi administrado surfactante exógeno. A fototerapia foi necessária em 10 neonatos. Conclusão: Foi verificada uma alta taxa de cesárea eletiva com nascimentos de RNPT-tardio e termo precoce. Cerca de 9% dos RN desenvolveram desnecessariamente morbidades com admissão em UTI e prolongamento de permanência hospitalar.