



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Caracterização Da Primeira Consulta De Enfermagem Do Recém-Nascido

**Autores:** STEFANIA ALBUQUERQUE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); LARISSA CLAUDINE PRADO VIANA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); PAULA ROSEMBERG DE ANDRADE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); ALINE SANTA CRUZ BELELA ANACLETO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); FLÁVIA SIMPHRONIO BALBINO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO); MARIA MAGDA FERREIRA GOMES BALIEIRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO)

**Resumo:** Introdução. Considerando que os óbitos no período neonatal representam o principal componente da mortalidade infantil no Brasil, preconiza-se que o primeiro atendimento ao recém-nascido ocorra ainda na primeira semana de vida visando à identificação de riscos e vulnerabilidades ao nascer. Objetivo. Descrever características da primeira consulta de enfermagem ao recém-nascido. Método. Estudo descritivo quantitativo realizado em uma instituição filantrópica de atendimento à saúde da cidade de São Paulo. A amostra foi composta por 19 crianças com até 30 dias de vida. A coleta de dados se deu por meio da revisão dos prontuários dos atendimentos de janeiro a junho de 2016, sendo aprovada pelos responsáveis pela instituição. Resultados. A média de idade dos recém-nascidos foi de 18 dias na primeira consulta de enfermagem. Os principais diagnósticos de enfermagem segundo a Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem foram: amamentação exclusiva 10 (52,6%), crescimento eficaz 18 (94,7%), desenvolvimento eficaz 18 (94,7%), papel parental eficaz 5 (26,3%), padrão de sono eficaz, 12 (63,1%), eliminações normais 16 (84,2%), adesão ao regime de imunização 13 (68,4%), risco de sufocação 9 (47,3%) e vínculo eficaz 8 (42,1%). As queixas apresentadas pelos responsáveis foram cólica do RN 3 (15,7%), constipação intestinal 2 (10,5%) e obstrução nasal 4 (21%). O aleitamento materno exclusivo foi o tipo de nutrição predominante 12 (63,1%). Conclusão. Embora a primeira consulta de enfermagem do RN tenha ocorrido após a primeira semana de vida, nota-se que os diagnósticos de enfermagem predominantes foram positivos e o aleitamento materno exclusivo prevaleceu.