



23º CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO – Gramado / RS

Trabalhos Científicos

Título: Enterorragia Benigna: Existe Associação Com Enterocolite Necrosante (Ecn)?

Autores: CLAUDIA BERTOLASI (PERINATAL); DANIELA QUEIROZ OLIVEIRA RICCIO (PERINATAL); PALOMA DE CARVALHO COSTA (PERINATAL); RENATA BASTOS LOPES (PERINATAL); JOSÉ MARIA DE ANDRADE LOPES (PERINATAL)

Resumo: Introdução: Nos últimos anos algumas publicações têm descrito surtos de enterorragia “benigna”, caracterizados por episódios de sangramento intestinal de curta duração sem alteração do estado geral e de boa evolução. Não se reporta a associação desses episódios com enterocolite necrosante (ECN). Em nosso hospital, observamos nos últimos dois anos uma série de casos de enterorragia “benigna” e decidimos estudar a sua associação com ECN. Objetivos: O objetivo desse estudo é descrever a incidência de enterocolite necrosante em uma população de recém-nascidos de muito baixo peso ao nascer (RNMP) durante um período de alta incidência de enterorragia benigna. Material e Métodos: Foi realizado um estudo retrospectivo. A população incluiu todos os recém-nascidos admitidos em 2 unidades de terapia intensiva neonatal, com peso de nascimento inferior a 1500g, no período de janeiro de 2015 a março de 2016. Resultados: No período do estudo houve um total de 40 casos de enterorragia benigna dos quais 12 apresentaram peso inferior a 1500g. Um total de 238 recém-nascidos foi incluído na nossa análise, dentre os quais 8 (3,4%) apresentaram ECN e 12 (5%) enterorragia benigna. Dos 8 pacientes com ECN, 2 (25%) foram tratados clinicamente e 6 (75%) foram submetidos à cirurgia. Pacientes com ECN apresentaram menor peso, menor idade gestacional, maior frequência de reanimação na sala de parto e menor Apgar de primeiro e quinto minutos. Em análise univariada ECN foi associada com persistência do canal arterial, uso de surfactante e sepse com hemocultura positiva. ECN foi um importante determinante na mortalidade. Conclusão: A incidência de ECN no período estudado foi baixa, apesar do aumento da incidência de enterorragia benigna observado.