



# 23<sup>o</sup> CONGRESSO BRASILEIRO DE PERINATOLOGIA

14 a 17 de setembro de 2016 - EXPOGRAMADO - Gramado / RS

## Trabalhos Científicos

**Título:** Comorbidades Neonatais Em Recém Nascidos Assistidos No Método Canguru Em Maternidade De Referência Em Alto Risco.

**Autores:** ANA KAROLINE DINIZ FELICIANO (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); ANGELA MARIA TORRES MELO (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); MARIANA FERRARI BELTRÃO (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); KAMILA APOLINÁRIO RODRIGUES (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); ANA CAROLINA MONTEIRO CHAGAS TEODÓSIO (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); JÉSSICA LAUREANO MARTINS (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); EUDA MARIA FARIAS DINIZ ARANDA (NEONATOLOGISTA E PRECEPTORA DA RESIDÊNCIA EM PEDIATRIA DA SES-PB); MYLLENA PASSOS MAIA COELHO (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); IGOR DO NASCIMENTO LINS (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB); MAC DOUGLAS DE OLIVEIRA LIMA (RESIDENTE EM PEDIATRIA DA SES-PB)

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A morbimortalidade neonatal é resultante de uma estreita e complexa relação de fatores genéticos, condições da gestação e parto, bem como das características da prematuridade e suas comorbidades. OBJETIVO: Demonstrar a frequência das comorbidades neonatais comumente visualizadas em recém-nascidos baixo peso e/ou prematuros (RNBP/PT) assistidos pelo método mãe canguru (MMC) em um Serviço de Referência em Alto Risco (SRAR). MÉTODO: Estudo retrospectivo e descritivo através de pesquisa em prontuários médicos do MMC do SRAR com os RNBP/PT que nasceram e obtiveram alta da 3ª fase do método no ano de 2015. RESULTADO: Da amostra de 166 RNBP/PT do MMC, obteve-se com uma média de idade gestacional do nascimento(IG) de 33,45 semanas com uma variação de 26 a 40 semanas. Entre as comorbidades presentes nesses recém nascidos a presença de icterícia foi vista em 56,02%, a infecção neonatal foi encontrada em 43,97%, hipoglicemia em 9,63%, anemia esteve presente em 5,42%, hemorragia pulmonar em 3,01% e uma frequência de 12,04% de cardiopatia. CONCLUSÃO: A IG encontrada foi semelhante a outros estudos de prematuridade. Dentre as morbidades infecção neonatal foi um achado semelhante, anemia foi inferior ao demonstrado em outros estudos, e a icterícia apesar de ter sido um dado considerável, foi inferior a outros estudos observados.