



24^o Congresso Brasileiro de
PERINATOLOGIA
de 26 a 29 de setembro de 2018
Natal • RN

Trabalhos Científicos

Título: Uso De Corticoide Antenatal Reduz A Necessidade De Aminas Nos Primeiros Três Dias De Vida Em Pacientes Com Muito Baixo Peso

Autores: MAEMI CASANAS OKUMURA (HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE RIBEIRÃO PRETO - FACULDADE DE MEDICINA DE RIBEIRÃO PRETO - USP), LAURA FERREIRA DUTRA, LUIS KANHITI OHAROMARI JUNIOR, DANIELA TRIPOLONI NANNI RINALDI, NATHALIA BORGES DE MELO, MELINA FAYAD VIEIRA, ADRIANA CARNEVALE, CRISTINA CALIXTO, PHILIPPE PINHEIRO DE PAIVA, DAVI CASALE ARAGON, WALUSA ASSAD GONÇALVES FERRI

Resumo: Introdução: A instabilidade hemodinâmica é uma das complicações mais desafiadoras na UTI neonatal (UTIN), devido à imaturidade do sistema cardiovascular desta população. Objetivo: avaliar as variáveis 8203,8203, associadas ao uso de drogas inotrópicas em RNMBP nos primeiros 3 dias de vida. Métodos: Estudo de coorte retrospectiva. Critérios de exclusão (360): morte na sala de parto, falta de dados e malformações congênitas. 789 pacientes nascidos de 2006 a 2015 foram avaliados. Dois grupos foram analisados: Sem necessidade de drogas e com uso de drogas inotrópicas (qualquer tipo e dose), de acordo com os médicos da equipe. A estimativa do risco relativo e intervalo de confiança foram realizadas utilizando modelo de regressão log-binomiais. Variáveis 8203,8203, de ajuste: peso ao nascer (PN), idade gestacional (IG) e sepse precoce. Resultados: A mediana de IG foi de 29,14 semanas [19,14 - 38,7], o PN mediano foi de 1060 gramas [410-1495], 250 pacientes usaram drogas inotrópicas durante as primeiras 72 horas de vida (31,68). Corioaminionite, hemorragia durante o trabalho de parto, PN 8804, 1000g, IG 8804, 28 semanas, ressuscitação na sala de parto, temperatura 8804, 35,9 ° C na admissão na UTIN e SNAPPE-II 8805, 20 foram identificados como preditores do uso de inotrópicos. Hipertensão materna RRAj 0,72 [IC 95 0,57-0,91] e uso de esteróides antenatais RRAj 0,57 [IC 95 0,46-0,7] foram protetores. Conclusão: Intercorrências durante o trabalho de parto, PN 8804, 1000 g, IG 8804, 28 semanas, hipotermia e ressuscitação na sala de parto são preditores de uso de drogas inotrópicas nos primeiros 3 dias de vida. A hipertensão materna e o uso de corticosteróides antenatais foram associados a menor uso de drogas inotrópicas em bebês de muito baixo peso no grupo avaliado.