



24º Congresso Brasileiro de
PERINATOLOGIA
de 26 a 29 de setembro de 2018
Natal • RN

Trabalhos Científicos

Título: Fatores Associados Aos Óbitos Neonatais E Pós-Neonatais Em Uma Maternidade Pública

Autores: ANA PAULA DE REZENDE BARROS (ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - DF), BÁRBARA VIDIGAL BRAGA, MARINA QUEIROZ TOBIAS COSTA, ANA LUÍSA ATAIDE MORAES, RUAN LUCAS BEZERRA FERREIRA, AMANDA NATALY ANDRADE DE PAULA, VITÓRIA DE LIMA FERNANDES, ALESSANDRA DE CÁSSIA GONÇALVES MOREIRA, BEATRIZ DE ARAÚJO NUNES GOMES, TATIANE MELO DE OLIVEIRA, MARTA DAVID ROCHA DE MOURA, EDUARDO HENRIQUE COSTA MORESI, LUDMYLLA DE OLIVEIRA BELEZA

Resumo: Introdução: Das cerca de 130 milhões de crianças que nascem por ano no mundo, em torno de 4 milhões morrem antes de completarem 28 dias de vida. No Brasil, em 2016, nasceram 2.836.829 bebês. Deve-se entender as causas dos óbitos e sua evitabilidade. Objetivo: Este trabalho procura descrever e analisar os fatores associados aos óbitos neonatais e pós-neonatais em uma maternidade pública. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo, onde foram analisados 277 óbitos ocorridos entre janeiro de 2016 e dezembro de 2017, em uma maternidade pública. Resultados: No período de 2 anos nasceram nesta unidade hospitalar 3915 RN e foram registrados 277 óbitos. 14,8 dos óbitos foram fetais, 30 ocorrem ainda na sala de parto e 55,2 dos óbitos aconteceram dentro da UTI Neonatal. 32,9 dos óbitos foram de bebês cujas mães vieram de outros estados, 51,6 fora da regional de assistência do hospital e 15,5 dos bebês foram atendidos durante o pré-natal na regional de assistência do hospital. 71,8 dos óbitos foram classificados como evitáveis e 39,7 tiveram suas declarações de óbito modificadas depois da análise pelo comitê de óbitos. 28,2 dos óbitos estavam ligados a prematuridade extrema (RN com IG 24 sem), 26,7 dos óbitos esteve ligado a malformações e 20,2 ligados a quadros infecciosos, sendo 12,5 causados por sífilis materna. Conclusão: Nota-se que o a investigação dos óbitos é um importante instrumento para o diagnóstico das falhas de desempenho dos serviços de saúde e a orientação de medidas para reduzir os óbitos infantis evitáveis.