



24º Congresso Brasileiro de
PERINATOLOGIA
de 26 a 29 de setembro de 2018
Natal • RN

Trabalhos Científicos

Título: Método Padovan, Uma Forma Alternativa No Tratamento De Paralisia Facial Congênita

Autores: LILIANNY MEDEIROS PEREIRA (FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE), DANIELE CORREIA VILEICAR, SAMARA BEZERRA SALES MACIEL, AUCÍLIA BRAGA MOREIRA, JÉSSICA OLIVEIRA FARIAS, SARAH VIVIAN GONÇALVES DE FREITAS, INGRYD RHAVENNA GONÇALVES DE FREITAS, LUCAS TAVARES CRUZ DE ALBUQUERQUE, ERIKSON DE LUNA DELMONDES, CARLA JOSEANE RODRIGUES FIGUEIREDO, RUAN LUCAS ROMÃO, ANA ALICK VIEIRA MACHADO LEITE, RAQUEL LEMOS BESSA DE OLIVEIRA, ADRIELLE SILVA ALENCAR, KEYLA PEREIRA GUIMARÃES, DAIANNY MESQUITA PONTE

Resumo: **INTRODUÇÃO:** O tipo mais comum de paralisia facial congênita é a paralisia unilateral isolada do lábio inferior, descrita por Kobayashi em 1974 (CULLP - congenital unilateral lower lip palsy). A paralisia facial pode comprometer o estabelecimento da alimentação via oral e do aleitamento materno. **OBJETIVO:** demonstrar a eficácia da reorganização neurofuncional pelo Método Padovan® na restauração da funcionalidade dos músculos da face em neonatos com paralisia facial congênita. **CASO CLÍNICO:** Paciente do sexo masculino diagnosticado com paralisia facial congênita direita isolada de lábio inferior. Capurro de 34 semanas e 6 dias, comprimento de 47 cm, peso de 2.255g, perímetro cefálico de 32 cm, perímetro torácico de 28,5 cm e Apgar de 8/9. recebeu ventilação mecânica por seis dias, Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) por três dias, realizou teste do pezinho, olhinho e orelhinha, ecocardiograma e tomografia de crânio, todos com resultado dentro dos padrões de normalidade, este último utilizado para fazer diagnóstico diferencial com paralisia traumática de parto. Como já é rotina no serviço foi iniciada a terapia de reabilitação pelo Método Padovan® que consiste de exercícios orofaciais (que estimulam os nervos cranianos), vestibulares, oculares e motores que buscam recapitular as fases neuroevolutivas do desenvolvimento humano com a finalidade de propiciar uma maturação neurológica do sistema nervoso central (SNC) e a correção de suas possíveis falhas. A terapia era realizada uma vez ao dia, cinco dias na semana e em 6 dias de terapia o RN apresentou sucção e no 7º dia estava mamando ao seio. **DISCUSSÃO:** A recuperação da lesão do nervo facial pode ocorrer em algumas semanas, até quatro anos. Os recursos sugeridos pela literatura são: cinesioterapia, massagem e eletrotermoterapia. A intervenção prioritária neste caso foi a utilização do Método Padovan®, pois é a terapia de rotina no serviço há 10 anos, devido experiências prévias de resultados rápidos em estabelecimento da sucção. Os exercícios ativos repetidos, segundo a literatura, alcança a reeducação muscular devido às repetições sistemáticas e coordenadas, favorecendo a reinervação das estruturas parcialmente danificadas. **CONCLUSÃO:** O Método Padovan® pode ser uma alternativa fácil e não onerosa para reestabelecimento da sucção em paralisia facial congênita.