



24º Congresso Brasileiro de  
**PERINATOLOGIA**  
de 26 a 29 de setembro de 2018  
Natal • RN

### Trabalhos Científicos

**Título:** Linfangioma Abdominal No Rn: Apresentação De Caso

**Autores:** KARINE SCHNAIDER RAMOS (HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS PINHAIS), CLAUDIANY FERREIRA DOS SANTOS, DAIANE CRISTINA MADUREIRA DE OLIVEIRA DARUGNA, DIANEFER MICHELE RONDOLI DE ALMEIDA, ELIS MARINA CAMPOS, KAREN WIGGERS, MARJORI GOMES MENS WOELLNER ZIGLIA, RAFAELLA GOMES FERREIRA BORGES, MARIANA CANATO, REGIANY PAULA GONÇALVES DE OLIVEIRA

**Resumo:** INTRODUÇÃO: Os linfangiomas são hamartomas vasculares, que resultam de falha no desenvolvimento evolutivo do sistema vascular. A incidência chega a 1:20000 e os mais comuns são os localizados nas regiões cervicais, axilar e inguinal, sendo o acometimento abdominal mais raro. OBJETIVO: Relatar um caso de recém-nascido com diagnóstico de linfangioma abdominal. MÉTODO Recém-nascido (RN) a termo (38 semanas), adequado para idade gestacional, do sexo feminino, APGAR 9 e10, apresentou ao exame clínico tumoração macia, móvel e indolor em flanco esquerdo medindo 8,5x9. Com 32 semanas de idade gestacional, ultrassom obstétrico evidenciou feto com imagem de massa heterogênea com ecogenicidade central mais acentuada, cuja hipótese diagnóstica pré-natal era de feto in fetu. O RN manteve-se assintomático e a tomografia de abdômen evidenciou lesão cística com septações associadas estendendo-se na região lateral do hemiabdomen esquerdo, entre os planos musculares. RESULTADO De 193 casos de linfangiomas descritos na literatura, 9,2 apresenta localização abdominal. A presença de massa visível e palpável é vista em 23-73 dos casos e cursa com contornos lisos, nítidos e de grande mobilidade, geralmente indolor. A etiologia é desconhecida, contudo, uma das teorias propõe falha na fusão do o sistema linfático com venoso, além de proliferações endoteliais e displasia linfática. Os sinais e sintomas ,quando existentes, resultam da compressão pelo processo expansivo, como, por exemplo, no trato gastrointestinal ocasionando dor abdominal, suboclusão ou oclusão. Por não haver aderência da lesão a planos profundos a abordagem cirúrgica é a melhor opção terapêutica e não há necessidade de tratamento prévio medicamentoso. CONCLUSÃO Linfangiomas são mal-formações vasculares raras, especialmente os de localização abdominal. Os sinais e sintomas dependem da extensão e comprometimento das estruturas adjacentes. O tratamento optado para o caso relatado foi a exérese cirúrgica.