



24º Congresso Brasileiro de
PERINATOLOGIA
de 26 a 29 de setembro de 2018
Natal • RN

Trabalhos Científicos

Título: Enfisema Lobar Congênito Diagnosticado No Período Neonatal: Relato De Caso

Autores: MELLINA GAZZANEO GOMES CAMELO MONTENEGRO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS), BRUNA DE SÁ DUARTE AUTO, GABRIELA CARVALHO NOBRE FAUSTINO, ELIS MATIAS SALES, JANAÍNA DA SILVA NOGUEIRA, DELIA MARIA DE MOURA LIMA HERRMANN, SIRMANI MELO FRAZÃO TORRES, RAQUEL CALHEIROS DA COSTA, FELIPE DE FIGUEIREDO ZACCARA

Resumo: INTRODUÇÃO: O ENFISEMA LOBAR CONGÊNITO (ELC) É UMA ENTIDADE RARA QUE USUALMENTE SE APRESENTA COM SINAIS DE DESCONFORTO RESPIRATÓRIO EM LACTENTES. SUA INCIDÊNCIA VARIA ENTRE 1 A CADA 70000 - 90000 NASCIDOS VIVOS. OBJETIVOS: DESCREVER UM CASO DESTA RARA PATOLOGIA, COM DIAGNÓSTICO PRECOCE. MÉTODOS: ESTUDO DESCRITIVO DE CASO CLÍNICO BASEADO EM REVISÃO DE PRONTUÁRIO. RESULTADOS: RECÉM-NASCIDO (RN), SEXO FEMININO, COM 16 HORAS DE VIDA, DE PARTO NATURAL, SEM INTERCORRÊNCIAS, É ADMITIDO EM UCI (UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS) NEONATAL, PROVENIENTE DE ALOJAMENTO CONJUNTO, APRESENTANDO DESCONFORTO RESPIRATORIO, CARACTERIZADO POR TAQUIPNEIA E TIRAGEM SUBCOSTAL. FORAM COLHIDOS CONTROLES INFECCIOSOS, SEM ALTERAÇÕES, E REALIZADA RADIOGRAFIA DE TORAX, A QUAL EVIDENCIOU IMAGEM DE HIPOTRANSPARÊNCIA EM PULMÃO ESQUERDO, COM INFILTRADO E ÁREAS CÍSTICAS DE PERMEIO COM CONDUTA INICIAL CONSERVADORA. REALIZOU-SE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX COM CONTRASTE, NO TERCEIRO DIA DE VIDA, A QUAL MOSTROU LOBO SUPERIOR DO PULMÃO ESQUERDO HIPEREXPANDIDO, DESVIANDO AS ESTRUTURAS DO MEDIASTINO PARA A DIREITA, COM OPACIDADES DE ATENUAÇÃO EM VIDRO FOSCO DIFUSAS, ÁREAS DE CONSOLIDAÇÃO E BRONCOGRAMA AÉREO DE PERMEIO E APARENTE ATRESIA DO BRÔNQUIO LOBAR SUPERIOR ESQUERDO, TENDO SIDO FEITO O DIAGNÓSTICO DE ELC DE LOBO SUPERIOR ESQUERDO COM ATRESIA BRÔNQUICA. O RN FOI SUBMETIDO À LOBECTOMIA SUPERIOR ESQUERDA, NO 22º DIA DE VIDA, SEM INTERCORRÊNCIAS NO PÓS-OPERATÓRIO. O HISTOPATOLÓGICO MOSTROU ENFISEMA PULMONAR COM FOCOS DE ATELECTASIA E HEMORRAGIA INTRA-ALVEOLAR. UM ANO APÓS A RESSECÇÃO, ESTE RN PERMANECE EM ACOMPANHADO EM AMBULATÓRIOS DE PEDIATRIA DE ALTO RISCO E DE PNEUMOLOGIA DA MATERNIDADE EM QUESTÃO E NÃO APRESENTA SEQUELAS. CONCLUSÃO: O RECONHECIMENTO E O DIAGNÓSTICO PRECOCE DA PATOLOGIA SÃO IMPORTANTES, PARA SE EVITAR COMPLICAÇÕES E INTERVENÇÕES DESNECESSÁRIAS, BEM COMO INSTITUIR O TRATAMENTO CIRÚRGICO ADEQUADO, LOBECTOMIA NA MAIORIA DOS CASOS.