



24º Congresso Brasileiro de  
**PERINATOLOGIA**  
de 26 a 29 de setembro de 2018  
Natal • RN

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Tempo De Internação Associado A Desmame Precoce Em Recém-Nascido De Muito Baixo Peso

**Autores:** NARA BARROS NUNES (UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS), ELY MENDES CARNEIRO JÚNIOR, NAIRA CHAVES DE MELO GIOIA FONSECA, SAMARAH PAULA NASCENTE JORCELINO VALENTE, SAMIRA PORTO DE ALMEIDA RIBEIRO, BRIZA CLAUDIAMARA ROCHA REGO, JEFFERSON PEREIRA GUILHERME

**Resumo:** A manutenção do aleitamento materno exclusivo no momento da alta do método Canguru de RNMBP deve ser meta a ser perseguida devido aos inúmeros benefícios do AME neste grupo de bebês. Foi interrogado se o tempo de internação destes pacientes teriam relação com o desmame precoce. Objetivos: Avaliar a associação do tempo de internação com o desmame precoce entre recém nascidos de muito baixo peso no momento da alta da terceira etapa. Métodos: Estudo observacional, transversal em que foram analisados dados de 143 prematuros muito baixo peso, atendidos no ambulatório da terceira etapa de uma maternidade de referência para alto risco, no ano de 2016. Projeto autorizado pelo CEP. Os prontuários foram utilizados para gerar um banco de dados no EXCEL 2016. Utilizou-se o software Bioestat 5.3 para cálculo da prevalência do desmame, da razão de prevalências (RP) e do Teste Exato de Fisher. Resultados: Em relação a idade cronológica na alta durante o seguimento da terceira etapa, os RN's que receberam alta com menos de 2 meses (44), 11 (25) desmamaram, aqueles que se mantiveram internados entre 2-4 meses (92), tiveram 1,78 vezes mais chances de desmamar que os primeiros e entre aqueles que passaram de 4 meses de internação, o desmame ocorreu em 71,4 (RP 2,85, IC 95 1,43-5,72,  $p=0,03$ ). Fatores como idade gestacional, peso ao nascer e complicações clínicas devem interferir neste desfecho. Conclusão: Pacientes que necessitam longos períodos de internação são particularmente suscetíveis ao desmame precoce e merecem estratégias da equipe de saúde que promovam o aleitamento materno, mesmo em unidades credenciadas pela IHAC e pelo método Canguru.