



24º Congresso Brasileiro de  
**PERINATOLOGIA**  
de 26 a 29 de setembro de 2018  
Natal • RN

### **Trabalhos Científicos**

**Título:** Fatores De Risco Associados À Síndrome Do Desconforto Respiratório

**Autores:** CAMILA FERNANDES DA CUNHA (UNIVERSIDADE POTIGUAR), ANA BEATRIZ DAVIM FERREIRA GOMES, DÉBORA NOGUEIRA FERNANDES, MAYLLA EDUARDA NASCIMENTO SILVA, CLARA EDWIGES FROTA MORAES, MAETHÊ ROMERO FROTA QUINDERÉ, THAIS CAVALCANTE CHAVES SANTOS, MARCELO AUGUSTO FIRMINO DE QUEIROZ, ALÊSSA QUEIROGA DE ARAÚJO, VITÓRIA MORAES ESTEVAM, MANOEL REGINALDO ROCHA DE HOLANDA

**Resumo:** INTRODUÇÃO: A Doença da Membrana Hialina, também conhecida como Síndrome da angústia respiratória do recém-nascido, é a doença respiratória mais frequente no período neonatal, sendo a maior causa de morbidade e mortalidade nessa faixa etária. OBJETIVOS: Determinar os fatores de riscos associados a SDR e a sua prevalência em prematuros que foram internados em unidade de terapia intensiva. MÉTODOS: Estudo transversal, realizado entre 2008 e 2014, analisando as características epidemiológicas da síndrome do desconforto respiratório congênito. Usando como critério de inclusão RNs com IG 34 semanas e de exclusão, a má formação congênita. Os fatores de risco associados analisados foram: idade materna, número de consultas pré-natais, número de gestações, corioamnionite, bolsa rota, restrição de crescimento intra-útero (RCIU), corticóide antenatal, tipo de parto, sexo, APGAR no 1º e 5º min, necessidade de reanimação neonatal, peso ao nascer, idade gestacional, persistência do canal arterial, trabalho de parto prematuro, doença hipertensiva específica da gestação (DHEG), oligoâmnio, diabetes gestacional, hemorragia peri-ventricular e retinopatia da prematuridade. Para analisar a significância foi realizada uma regressão logística binária. RESULTADOS: Dentre os 181 recém nascidos analisados, 166 apresentaram SDR. Dos fatores de risco avaliados a presença de corioamnionite e a ausência da realização de pré-natal apresentaram significância estatística (p 0,000 e p 0,015 respectivamente). CONCLUSÃO: Os resultados obtidos estão de acordo com o que apresenta a literatura. Ressaltando a importância da qualificação dos processos assistenciais nos serviços de pré-natal, e, em particular, os que atendem ao parto e nascimento