



25^o Congresso Brasileiro de Perinatologia

1 a 4 de dezembro de 2021 - Salvador/BA

#neozuntos



Trabalhos Científicos

Título: Hérnia De Amyand Em Prematuro

Autores: ISABELLA VIDAL (HOSPITAL REGIONAL NORTE), MARDÔNIO NOGUEIRA , SIOMARA RODRIGUES, PLUTARCO PARENTE

Resumo: INTRODUÇÃO HÉRNIA DE AMYAND É A PRESENÇA DO APÊNDICE CECAL NO INTERIOR DO SACO HERNIÁRIO DE UMA HÉRNIA INGUINAL. É MAIS PREVALENTE EM INDIVÍDUOS DO SEXO MASCULINO, PRINCIPALMENTE EM NEONATOS E PACIENTES COM MAIS DE 70 ANOS. O ENCARCERAMENTO DA HÉRNIA INGUINAL É COMUM NA INFÂNCIA, PRINCIPALMENTE EM RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS. RELATOS DE APENDICITE NEONATAL EM HÉRNIA ENCARCERADA, ENTRETANTO, SÃO RAROS. POR CONTA DO DIFÍCIL DIAGNÓSTICO, ESSA CONDIÇÃO É COMUMENTE ASSOCIADA A ALTA MORTALIDADE NESSE GRUPO DE PACIENTES. OS AUTORES RELATAM UM CASO DE HÉRNIA DE AMYAND ESTRANGULADA, COM APENDICITE, APRESENTANDO-SE COMO ESCROTO AGUDO EM UM RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO. DESCRIÇÃO DO CASO RECÉM-NASCIDO PRÉ-TERMO, 30 SEMANAS, PESANDO 1040g AO NASCER, NECESSITANDO DE INTERNAMENTO EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL, EVOLUINDO COM SINAIS E SINTOMAS CLÍNICOS SUGESTIVOS DE ESCROTO AGUDO. FOI SUBMETIDO A INTERVENÇÃO CIRÚRGICA COM 53 DIAS DE VIDA, DURANTE A QUAL FOI EVIDENCIADO PRESENÇA DE APÊNDICE CECAL ENCARCERADO EM CANAL INGUINAL DIREITO, PERFURADO DURANTE MANIPULAÇÃO. FORAM REALIZADOS APENDICECTOMIA E CORREÇÃO DE HÉRNIA INGUINAL. DISCUSSÃO A APENDICITE NO RECÉM-NASCIDO POSSUI SINAIS E SINTOMAS INESPECÍFICOS PODENDO OCORRER RETARDO NO DIAGNÓSTICO, O QUE FAVORECE A PERFURAÇÃO DO APÊNDICE E PIOR PROGNÓSTICO. O APÊNDICE PODE FAZER PARTE DO CONTEÚDO DO SACO HERNIÁRIO, PERMANECENDO ENCARCERADO, COMO OBSERVADO NO CASO DESCRITO. EVOLUTIVAMENTE, ESTE APÊNDICE PODE LEVAR A UM PROCESSO INFLAMATÓRIO NA BOLSA TESTICULAR, DIFICULTANDO AINDA MAIS O DIAGNÓSTICO PRÉ-OPERATÓRIO. NESSE CASO FOI INDICADA A CIRURGIA PARA EXPLORAR O TESTÍCULO, SENDO FEITO O DIAGNÓSTICO DE APENDICITE NO INTRA-OPERATÓRIO. TAL DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DEVE SEMPRE SER LEMBRADO, UMA VEZ QUE APENDICITE AGUDA NÃO DIAGNOSTICADA AUMENTA CONSIDERAVELMENTE A MORBIMORTALIDADE. CONCLUSÃO APESAR DE RARA, A APENDICITE AGUDA EM HÉRNIA INGUINAL ENCARCERADA DEVE SER CONSIDERADA UM DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ESCROTO AGUDO EM RECÉM-NASCIDO PREMATURO. O DIAGNÓSTICO PRECOCE INCIDE DIRETAMENTE NO PROGNÓSTICO E NA REDUÇÃO DA MORTALIDADE.