



25^o Congresso Brasileiro de Perinatologia

1 a 4 de dezembro de 2021 - Salvador/BA

#neojuntos



Trabalhos Científicos

Título: Revisão Integrativa: Cuidados De Enfermagem Na Inserção E Manutenção De Sondas Enterais Em Neonatologia

Autores: ALINE MARCIA DE SOUZA BISPO (HOSPITAL UNIVERSITÁRIO CASSIANO ANTÔNIO DE MORAES), BRUNA GOMES DE SOUZA, SHEILLA SALVADOR SANTANA GONÇALVES, ANNA KÉSIA GUERRAT TEIXEIRA, ANTÔNIO FLÁVIO DOS SANTOS, CAMILA MEDEIROS CRUVINEL CUNHA, ELIZANGELA SANT'ANNA DA SILVA, GLÁUCIA CRISTINA DOS SANTOS FRANÇA DE SANT'ANA, LAÍS CAETANO SILVA, SOFIA SAITER RIZZO, JHONATHAN LUCAS ARAUJO, JULIA LAGE MUNIZ, MARCELA FALBO GUIMARÃES, THAÍS DA ROCHA CICERO PINTO, TONYARA PATRICIA NOGUEIRA, SUELI ALVES FERNANDES, ADRIANA SANTOS SOUSA RIBEIRO, RENATO FÉLIX DE SOUZA, LETICIA LEONE VALIATI, MARINALVA CARLA DA SILVA SOUZA

Resumo: Introdução: Recém nascidos (RN) internados em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) frequentemente necessitam de alimentação por via enteral. Objetivo: Descrever sobre a importância dos cuidados de enfermagem relacionados a manutenção da sonda enteral (SE) em RN internados em UTIN. Método: Trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada em busca nas bases de dados LILACS, Scielo, Medline e BDNF, sendo identificados nos últimos 10 anos, 8 artigos após aplicabilidade dos critérios de inclusão e exclusão. Resultado: Durante o período de internação dos RN, faz-se necessário garantir o suporte nutricional, devido as baixas reservas calóricas ao nascimento, não somente pela melhora da sobrevivência, mas também para reforçar o crescimento e o desenvolvimento destes. Na UTIN, a forma mais utilizada para a nutrição enteral dos RN é através do uso de cateter que vão até o estômago, sendo eles introduzidos na cavidade oral, as sondas orogástricas (SOG), ou por uma das narinas, as sondas nasogástricas (SNG). A administração da dieta por via enteral deve ser iniciada logo que o RN apresente estabilidade para a manutenção da funcionalidade do sistema gastrointestinal, dos hormônios digestivos e prevenção de patógenos intestinais. A localização inadequada da SOG ou SNG pode acarretar diversas complicações, como a broncoaspiração, pneumonias, problemas de absorção, lesões no trajeto durante a inserção, assim como a perfuração do trato gastrointestinal ou respiratório. Diante disso, destaca-se a importância de cuidados de enfermagem com relação a inserção e manutenção desses dispositivos, de forma a garantir o posicionamento adequado, fixação segura do dispositivo antes do uso do mesmo, assim como o correto posicionamento do paciente e da seringa durante o procedimento de gavagem da dieta. Conclusão: Os RN na UTIN em uso de SE necessitam de uma assistência de enfermagem por uma equipe qualificada, capaz de garantir o uso e manutenção segura das SE. A nutrição enteral é capaz de melhorar a recuperação de RN enfermos corroborando para um adequado crescimento e desenvolvimento até que esses neonatos apresentem prontidão para alimentação por via oral, especialmente a amamentação.