



26º CONGRESSO BRASILEIRO DE  
**PERINATOLOGIA**  
Florianópolis-SC

#NeoJuntos

11 A 14  
DE OUTUBRO

CentroSul Florianópolis  
Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis - SC



## Trabalhos Científicos

**Título:** Relação “Near Miss Baby” E “Near Miss Mom” - Indicadores Importantes Da Assistência Materno-Infantil

**Autores:** FERNANDA ACHKAR (UNISA), JANE ESTON ARMOND (UNISA)

**Resumo:** [INTRODUÇÃO] - O termo “near miss” é utilizado como ferramenta para avaliar e melhorar a qualidade da assistência, aplicado primeiramente no estudo da saúde materna, contudo, recentemente tem sido usado no contexto neonatal. Existe uma grande relação entre o “near miss mom” e o “near miss baby” tendo em vista que muitas das características maternas estão relacionadas com a incidência da morbidade neonatal. [OBJETIVOS] - O presente estudo teve como objetivo verificar as características dos recém nascidos que tiveram complicações graves, devido à gestação, parto e puerpério, as variáveis maternas associadas à morbidade infantil grave. [METODOLOGIA] - Estudo observacional longitudinal retrospectivo do tipo caso e controle, realizado por meio de levantamento de prontuários no Serviço de Arquivo Médico e Estatística (SAME) do Hospital Maternidade de Interlagos, localizado na região sul da cidade de São Paulo, no ano de 2019. [RESULTADOS] - Após a seleção da amostra de interesse, foram coletados os dados de interesse para a pesquisa que abordaram informações em relação à mãe e ao recém nascido. Aplicamos o Teste de Mann Whitney para comparar as variáveis do Apgar de 1º ( $p = 0,30$ ) e 5º minuto ( $p = 0,47$ ) inadequados que mostraram ser não significativos. Entretanto, a partir do Teste do Qui Quadrado obtivemos o valor de  $\chi^2=1,26$  e  $p=0,3582$  e com o Teste Exato de Fisher  $p= 0,0154$  demonstrando que a análise da frequência foi significativa devido o maior número de inadequados entre os casos. Por meio desse mesmo teste comparamos os desfechos dos RN sendo possível observar que o número de abortos dos casos foi significativamente maior do que no controle, observando a importante relação da saúde materna com a saúde infantil. Além disso, observamos as complicações presentes nos recém-nascidos, entre elas sofrimento e bradicardia fetal, internação da unidade de terapia intensiva e restrição de crescimento. A significância de um pré-natal adequado, que foi maior no controle e a significância de parto normal que também foi maior no controle. A presença de comorbidades maternas não se apresentou significativa, na comparação entre os casos e controles. [CONCLUSÃO] - Através do estudo realizado foi possível concluir a importância da correlação da saúde materna-fetal. Apesar de não terem sido todos os fatores que mostraram ser significativos e contribuintes para o aumento do “near miss baby” com relação ao “near miss mom”. Portanto, da mesma forma, é possível concluir que existe sim uma forte relação da saúde materna e infantil e maiores cuidados devem ser levados em consideração, principalmente com relação a adequabilidade do pré-natal e maior cuidado com a assistência neonatal e puerperal, evitando desfechos desfavoráveis ao recém nascido e às mães.