

Trabalhos Científicos

Título: Uso De Nutrição Parenteral Na Uti Neonatal

Autores: MARIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA (UFNT - HDT), ALIANDRA ORLANDINO AZEVEDO (UFNT - HDT), RAQUEL CARNIO (UFNT - HDT), IZABELA MOTA (UFNT - HDT), MARIA IVA MARANHÃO MOREIRA (HMDO)

Resumo: [INTRODUÇÃO] - O uso de nutrição parenteral (NP), sendo ela parcial ou total, é a terapêutica de escolha entre os recém nascidos (RN) que estão sem possibilidade de receber na totalidade as necessidades nutricionais através do sistema gastrointestinal, mudando o desfecho daquele RN. [OBJETIVOS] - Comparar o uso de NP em RNs < 1500g, com o recomendado, na UTI neonatal, no ano de 2021 e 2022 via estratégia Qualineo norte. [METODOLOGIA] - Foram observados 73 recém nascidos no períodos, com o peso de nascimento < 1500g, entre 2021 e 2022, que foram utilizados nele a NP parcial ou total. Classificados e documentados pela a estratégia Qualineo norte. [RESULTADOS] - Entre os RN < 1500g, os que utilizaram a NP parcial ou total, viu-se que 82% do total de nascidos nesta faixa de peso fizeram uso, em outros locais - 76%, 31% no início no primeiro dia de vida, em comparação com os outros lugares de 58,52%, 65% do 2730, ao 4730, dia de vida versus 32,3% em comparação com as outras unidades, de 5 a 7 dias 1,67%, em comparação com 2,33% e acima de 7 dias de via 1,67% versus 2,69%. O tempo em dias da utilização da NP foi de uma média de 5,55 - em relação a outros locais a média de 10 dias. O início da dieta enteral no 1730, dia de vida foi de 92,96%, comparado com 46,29%. Desde o início da NP, ele tem mostrado-se ser um aliado poderoso, salvador de vidas dos RNs prematuros de muito baixo peso. A recomendação é que deve-se iniciar dentre os primeiros 2 dias de vida. Visto que os RNs em questão, 31% tiveram a NP iniciada no 1730, dia e 65% entre o 2 e 4730, dia , totalizando 86%, uma faixa consideravelmente alta em relação aos outros locais. O tempo médio de NP mostrou-se inferior em relação a outros locais, o que nos leva a pensar que a progressão da dieta enteral é mais rápida, com uma menor taxa de complicações relacionadas ao uso de NP. [CONCLUSÃO] - Foi observado que, mesmo não sendo iniciado na totalidade a NP como recomendado, grande parte dos RNs fazem uso, ademais, com uma menor duração de tempo. Mostrando que a progressão rápida da dieta enteral e uma indicação precisa da NP, evoluem com melhores desfechos e menores complicações.